

“Medicamentum” SRL
Republica Moldova

MEDIFERON soluție injectabilă	MED-DO 064/2017
Ediția	2
Revizia	01
Pagina	70/103

Compoziție. 1ml conține:

Fier dextran	7mg
Clorură de cupru	27μg
Clorură de cobalt	2,6μg
Vitamina B ₁	30μg
Vitamina B ₂	11,4μg
Vitamina B ₅	16μg
Vitamina B ₆	2,8μg
Vitamina PP	428,4μg
Solvent	pînă la 1ml



de uz veterinar

100 ml

MEDIFERON

Soluție injectabilă de fier dextran îmbogățită cu microelemente și vitaminele grupei B

Mod de administrare și doză.

- Purceuși de 3-7 zile – 5ml subcutanat, cu repetarea acestei doze după 7-10 zile.
- Purceuși mai mari și porci 10-20ml subcutanat sau intramuscular cu eventuala repetare a dozei după 7-10 zile.

A nu se administra într-un singur loc mai mult de 10 ml preparat!

Temp de așteptare.

- Țesuturi comestibile – 48 ore.
- Țesuturile unde se efectuează injecția nu pot fi consumate timp de 5 zile.

Termen de valabilitate. 24 luni

Producător: SRL “Medicamentum”
Moldova, Anenii Noi, Merenii Noi tel/fax: 0-265-62-246, mob.: 0 671 78 384,
e-mail: medicamentum@mail.ru

Acest produs este fabricat de SRL “Medicamentum”
ce deține certificatul: ISO 9001:2008



Seria: Fab.:

MEDIFERON

–soluție injectabilă de uz veterinar–

Compoziție. Fier dextran 7mg; Clorură de cupru 27μg; Clorură de cobalt 2,6 μg; Vitamina B₁ 30 μg; Vitamina B₂ 11,4 μg; Vitamina B₅ 16 μg; Vitamina B₆ 2,8 μg; Vitamina PP 428,4 μg; Solvent pînă la 1 ml.

A acțiune farmacoterapeutică.

Produsul completează deficitul de fier, stimulează hematopoeza, mărește nivelul de hemoglobină și numărul de eritrocite, sporește vitalitatea purceilor.

Specii țintă. Porcine.

Indicații. Profilaxia și tratamentul anemiei feriprive a porcinelor, în deosebi a nou-născuților.

Mod de administrare și doze.

Atenție! În prealabil de agitat soluția 5-10 secunde.

Purceuși de 3-7 zile – 5 ml, subcutanat, cu repetarea acestei doze după 7-10 zile;

Purceuși mai mari, purcei și porci 10-20 ml subcutanat sau intramuscular cu eventuala repetare a dozei după 7-10 zile.

A nu se administra într-un loc mai mult de 10 ml produs!

Contraindicații.

Nu se administrează la porci (purcei) suspecți de carențe de vitamina E și /sau de seleniu.

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanța activă.

Nu se folosește fier-dextran la porci adulți deoarece la animalele cu vîrsta peste 4 săptămîni poate apărea pătarea cărnii.

Reacții adverse.

În locul aplicării pot apărea edeme, care dispar la cîteva zile.

Temp de așteptare.

Țesuturi comestibile – 48 ore.

Țesuturile unde s-a efectuat injecția nu pot fi consumate timp de 5 zile.

Condiții de pastrare. La temperatura 10 - 15°C, ferit de lumină.

A se feri de îngheț.

Termen de valabilitate. 24 luni.

Mod de prezentare.

Flacoane cu 100 ml produs însoțite de prospectul de utilizare.

Producător. „Medicamentum” SRL, R. Moldova, r. Anenii Noi, s. Merenii Noi, tel/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39, e-mail: medicamentum@mail.ru www.medicamentum.md