

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Bayvarol Strip

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

-Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.

-Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.

-Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

-Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripție veterinară:

-Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. Denumirea și adresa deținătorului certificatului de înregistrare și ale producătorului/fabricantului responsabil pentru eliberarea medicamentului de uz veterinar

Deținătorul certificatului de înregistrare:

Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Germania

Producătorul:

KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel, Germania

2.Denumirea medicamentului de uz veterinar, concentrația și forma farmaceutică ale acestuia

Bayvarol Strip 3,6 mg/banda, benzi impregnate pentru albine melifere

Benzi din polietilenă de culoare albă netransparente.

3. Indicații terapeutice (pe specie tinta)

Pentru diagnosticul și tratamentul infestării cu *Varroa destructor* la albinele melifere.

4.Contraindicații

A nu se utiliza în timpul perioadelor de cules.

A nu se utiliza concomitent cu alte medicamente pentru combaterea Varroa.

A nu se utiliza concomitent cu alte medicamente pentru combaterea nosemozei.

5. Reacții adverse

Nu se cunosc. Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

6. Specii țintă

Albine melifere.

7. Posologie pentru fiecare specie, metoda, modul de administrare

Pentru utilizare doar în stupi.

Coloniile normal dezvoltate primesc patru benzi.

Nucleeele coloniile tinere primesc jumătate de doză de exemplu, două benzi.

Coloniile mari care au mai multe rame cu puiet, primesc patru benzi pentru fiecare spațiu dintre ramele cu puiet, distribuite uniform.

Diagnostic

Benzile se introduc în stup timp de 24 de ore. Înainte de introducerea benzilor, acoperiți podeaua stupului sau tăvița din stup cu o coală albă de hârtie. După 24 de ore de la introducerea benzilor, verificați dacă pe coală există căpușe (*Varroa destructor*) moarte. În cazul în care numărul de acarieni morți nu este crescut după prima zi de tratament este recomandabil să se folosească altă clasă de

acaricide.

Tratament

Benzile vor fi lasate în colonie maxim șase săptămâni, după care se vor scoate.

Recomandări privind administrarea corectă

- Benzile de Bayvarol sunt suspendate între spațiile dintre faguri în zona centrală, astfel încât să fie acoperite de albine pe ambele fețe. Ambele agățatori ale unei benzi se îndoaie în sus în aceeași direcție, de-a lungul liniei marcate și se agață de marginea superioară a ramelor de lemn.
- În coloniile mari care au mai multe rame cu puiet, cele două benzi pot fi unite astfel încât la introducerea și extragerea lor să nu fie nevoie să îndepărtăm ramele.
- Eficacitate maximă se obține când Bayvarol se utilizează spre sfârșitul verii, după recoltarea mierii.
- Bayvarol poate fi utilizat în orice moment al anului în scop de diagnostic sau în infestații severe, când este amenințată supraviețuirea coloniei.

8. Perioada de așteptare

0 zile.

9. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 25 °C.

A se proteja de lumină.

A se păstra în loc uscat.

A nu se desface folia decât înainte de a se utiliza benzile.

10. Precauții speciale pentru eliminarea medicamentului de uz veterinar neutilizat sau a deșeurilor provenite de la medicamentul de uz veterinar

Produsul veterinar fără etichetă, cu termenul de valabilitate expirat, deteriorat sau deschis, trebuie eliminat în conformitate cu cerințele locale.

11. Atenționări speciale

Numai pentru diagnosticul și tratamentul infestării cu Varroa la albinele melifere.

Spălați-vă pe mâini după utilizarea benzilor, înainte de a consuma alimente și după terminarea lucrului.

Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor, după caz.

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

12. Perioada de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 5 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: utilizați benzile după deschiderea pungii.

Se interzice utilizarea produsului după data de expirare.

13. Statutul legal

Se eliberează în baza prescripției veterinare

14. Natura și compoziția ambalajului primar

Cutie de carton cu 5 pungi a câte 4 benzi fiecare

15. Data ultimei revizui a textului

19/08/2019

Numai pentru uz veterinar

