

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Bayvarol Strip 3,6 mg/banda, benzi impregnate pentru albine melifere

2. COMPOZIȚIE CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

2.2.1 Substanțe active:

O bandă de 6,61 g conține - Flumetrin 3.6 mg/banda.

2.2.2 Excipienți:

Pentru lista completă a excipienților, vezi secțiunea 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Benzi impregnate.

Benzi din polietilenă de culoare albă netransparente.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă

Albine melifere.

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă

Pentru diagnosticul și tratamentul albinelor melifere infestate cu Varroa destructor sensibilă la flumetrina.

4.3 Contraindicații

A nu se utiliza în timpul perioadei de cules.

4.4 Atenționări speciale

Nici una

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizarea la animale

Rezistența paraziților la orice clasă de acaricide se poate dezvolta în urma folosirii frecvente și repetate de substanțe acaricide din aceeași clasă.

Utilizarea cu precauție a substantelor acaricide

Pentru a scădea potențialul de dezvoltare a rezistenței se recomandă ca utilizarea de flumetrin în stupină să fie planificat anual ca parte a unui tratament de combatere a Varroa și cu alte clase de acaricide.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor menționate în RCM pot favoriza răspandirea indivizilor de Varroa rezistenți la piretroide.

Nu se vor lăsa benzile în stupi mai mult de șase săptămâni și nu se vor reutiliza benzile, deoarece ar putea declanșa dezvoltarea rezistenței.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale

Spălați-vă pe mâini după utilizarea benzilor, înainte de a consuma alimente și după terminarea lucrului. Nu deschideți ambalajul decât imediat înaintea utilizării. Evitați contactul benzilor cu mierea.

Nu mâncați, beți sau fumați în timpul utilizării produsului.

4.6 Reacții adverse (frecvența și gravitate)

Nu se cunosc.



4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Nu este cazul.

4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

A nu se utiliza concomitent cu alte medicamente pentru combaterea varrozei.

A nu se utiliza concomitent cu alte medicamente pentru combaterea nosemozei.

4.9 Doza de administrat și calea de administrare

4.9.1 Doze

Pentru utilizare doar în stupi.

Coloniile normal dezvoltate primesc patru benzi.

Nucleele coloniile tinere primesc jumătate de doza de exemplu, două benzi.

Coloniile mari care au mai multe rame cu puiet, primesc patru benzi pentru fiecare spațiu dintre ramele cu puiet, distribuite uniform.

Diagnostic

Benzile se introduc în stup timp de 24 de ore. Înainte de introducerea benzilor, acoperiți podeaua stupului sau tăvița din stup cu o coală albă de hârtie. După 24 de ore de la introducerea benzilor, verificați dacă pe coală există căpușe (*Varroa destructor*) moarte. În cazul în care numărul de acarieni morți nu este crescut după prima zi de tratament este recomandabil să se folosească altă clasă de acaricide.

Tratament

Benzile vor fi luate în colonie maxim șase săptămâni, după care se vor scoate.

4.9.2 Mod de administrare

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Benzile de Bayvarol- Strip sunt suspendate între spațiile dintre faguri în zona centrală, astfel încât să fie acoperite de albine pe ambele fețe. Ambele agățatori ale unei benzi se îndoaie în sus în aceeași direcție, de-a lungul liniei marcate și se agață de marginea superioară a ramelor de lemn.

În coloniile mari care au mai multe rame cu puiet, cele două benzi pot fi unite astfel încât la introducerea și extragerea lor să nu fie nevoie să îndepărtăm ramele.

Eficacitate maximă se obține când Bayvarol se utilizează spre sfârșitul verii, după recoltarea mierii.

Bayvarol poate fi utilizat în orice moment al anului în scop de diagnostic sau în infestații severe, când este amenințată supraviețuirea coloniei.

Apicultura responsabilă în aceste zile necesită o verificare periodică pentru infestarea cu *Varroa* și realizarea unui program anual de combatere a *Varroa* specific în fiecare stupină.

4.10. Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

Nu este cazul.

4.11 Perioada de așteptare

0 (zero) zile.

5. PROPRIETATI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice


5.1.1 Grupa farmacoterapeutică: Ectoparaziticide, insecticide și repelente, piretrine și piretroizi.

Codul veterinar ATC: QP53AC05

5.1.2 Mecanism de acțiune, efecte farmacodinamice, eficacitate și siguranța clinică

Conform cunoștințelor actuale piretroidele de sinteză interacționează cu canalele de sodiu ale celulelor nervoase conducând la o întârziere în repolarizarea nervilor.

Alfa-ciano piretroidele (piretroide de tipul II) cum ar fi flumetrinul par a fi mult mai puternice și astfel au un efect de lungă durată determinând o suită de impulsuri repetitive, în celulele nervoase.



Studiile structurii unor insecticide piretroide sugerează ca piretroidele se leagă de receptori cu o anumită formă chiralică și astfel se exercită activitatea selectivă observată asupra ectoparaziților.

Nu a fost observată activitate anti-colinesterazică la acești compuși.

5.2 Particularitati farmacocinetice

Există o ușoară eliberare continuă de flumetrin de la banda de polietilenă. Flumetrinul aderă de albine și este apoi distribuit tuturor membrilor coloniei prin contact direct.

6. PARTICULARITATI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipientilor

Polietilenă de joasă densitate.

6.2 Incompatibilități

Nu se cunosc.

6.3 Perioada de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 5 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: utilizați benzile după deschiderea pungii.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare

A se păstra la temperatură mai mică. de 25 °C.

A se proteja de lumină.

A nu se desface folia decât înainte de a se utiliza benzile.

A se păstra în loc uscat.

6.5 Natura compoziția ambalajului primar

Cutie de carton cu 5 pungi a câte 4 benzi fiecare.

6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen Germania

8. NUMARUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

190072

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE (sau data reînnoirii certificatului de înregistrare)

21.01.2010 / 27.11.2019

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI TEXTULUI

11/2019

