

Prospectul medicamentului de uz veterinar

Kiltix zgardă antiparazitară pentru câini de talie mică

Kiltix zgardă antiparazitară pentru câini de talie medie

Kiltix zgardă antiparazitară pentru câini de talie mare

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. Denumirea și adresa deținătorului certificatului de înregistrare și ale producătorului/fabricantului responsabil pentru eliberarea medicamentului de uz veterinar

Deținătorul:

Bayer Animal Health GmbH,
D-51368 Leverkusen, Germania

www.bayer.ua

Producătorul:

KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH,
Projensdorfer str.324,
24106 Kiel, Germania

2. Denumirea medicamentului de uz veterinar, concentrația și forma farmaceutică ale acestuia

Zgarda kiltix pentru caini de talie mica, mijlocie, mare

Compoziție: Flumetrin - 22,5 mg/g, Propoxur - 100 mg/g

	Lungime	Greutate	Propoxur	Flumetrin
Kiltix zgardă antiparazitară pentru câini de talie mică	38 cm	12,5 g	1,25 g	0,28 g
Kiltix zgardă antiparazitară pentru câini de talie medie	53 cm	30,2 g	3,02 g	0,68 g
Kiltix zgardă antiparazitară pentru câini de talie mare	70 cm	45 g	4,50 g	1,013 g


3. Indicații terapeutice (pe specie tinta)

În tratamentul infestațiilor cu căpușe (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) și purici (*Ctenocephalides canis / felis*) și pentru protejare împotriva reinfestării. După aplicare zgarda este eficientă împotriva căpușelor și puricilor până la 7 luni.

4. Contraindicații

Nu se utilizează la animale cu obstrucție mecanică a aparatului digestiv sau urinar, astm bronșic sau alte afecțiuni pulmonare și cardiovasculare deoarece carbamații pot declanșa contracția musculaturii netede.

Nu se utilizează la căței cu vârsta mai mică de 3 luni.



Nu se utilizează la animale cu leziuni ale pielii.

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

5. Reacții adverse

În cazuri foarte rare, pot apărea reacții la locul de aplicare, cum ar fi prurit, eritem, leziuni și pierderea părului.

În cazuri foarte rare unele animale pot prezenta o ușoară senzație de mâncărime sau înroșire a pielii după aplicarea zgărzii.

Foarte rar pot apărea simptome cum ar fi vomă, diaree sau salivă după expunerea la produs pe cale orală.

Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:

- Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale care prezintă reacții adverse în timpul unui tratament)
- Frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale)
- Mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale)
- Rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale)
- Foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale, inclusiv, raportările izolate)

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

6. Specii țintă

Câini.

7. Posologie pentru fiecare specie, metoda, modul de administrare

Câini de talie mică primesc o zgardă de 38 cm lungime (12.5 g), Câini de talie mijlocie primesc o zgardă de 53 cm lungime (30,2 g), Câini de talie mare primesc o zgardă de 70 cm lungime (45 g). Zgarda se scoate din punga de protecție, se desface și se îndepărtează bucățile de plastic rezultate din procesul de turnare, aflate pe partea interioară a zgărzii. Se fixează zgarda în jurul gâtului iar partea rămasă liberă se introduce în cataramă. Verificați periodic dacă zgarda este aplicată corect și dacă este confortabilă pentru animal. Zgarda trebuie purtată tot timpul. Indiferent dacă câinele se odinește sau se plimbă zgarda este eficientă.

Recomandări privind administrarea corectă -

De zece ori mai mulți purici sunt prezenți în așternut și în jurul animalului de companie (covoare și draperii) și de aceea trebuie regulat utilizate substanțe paraziticide și aspirate aceste locuri. Aceste măsuri ajută la reducerea infestării cu purici din mediul înconjurător și crește eficacitatea împotriva unor noi infestări ale câinelui. Câini care au blana aspră, încurcată sau murdară trebuie spălați și șamponați înainte de aplicarea zgărzii. Contactul frecvent cu apa (ploaia, înotul, îmbăierea) pot reduce eficacitatea produsului. Eficacitatea și durata efectivă de utilizare este determinată de lungimea, grosimea și condiția blănii dar și de presiunea parazitară. Dacă eficacitatea produsului se diminuează este necesar să fie înlocuită mai repede. În unele cazuri căpușele se pot urca pe câine, chiar dacă acesta are zgardă. Căpușele se ascund în blană însă cad apoi în maxim 3 zile fără să fi supt sânge.

8. Perioada de așteptare

Nu este cazul.



9. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 30 °C.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe cutie (Exp).

10. Precauții speciale pentru eliminarea medicamentului de uz veterinar neutilizat sau a deșeurilor provenite de la medicamentul de uz veterinar

Nu se vor contamina râuri, lacuri, cursuri de apă, baraje și alte surse de apă cu produsul neutilizat.

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale veterinare trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

11. Atenționări speciale

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

De regulă căpușele sunt omorâte și cad de pe gazdă până la 72 de ore după infestare, fără să fi avut o masă de sânge. Atașarea de căpușe izolate după tratament nu poate fi exclusă. Din acest motiv, transmiterea unor boli infecțioase cauzate de căpușe, nu poate fi exclusă complet dacă condițiile sunt nefavorabile.

Precauții speciale pentru utilizare

Copiii trebuie să evite contactul cu animalele care poartă zgarda.

Depozitați departe de alimente și furaje/hrană.

Copii nu se vor juca cu zgarda.

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Puricii pot fi gazde intermediare pentru tenii, prin urmare se recomandă să se utilizeze simultan și produse medicinale veterinare endoparazitare.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Evitați contactul direct cu ochii și pielea.

Nu beți, nu mâncați și nu fumați în timpul manipulării zgărzii.

Spălați-vă bine pe mâini cu apă și săpun după manipularea zgărzii.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanțele active sau la orice excipient trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.


Acest produs conține un carbamat (propoxur). În caz de simptome toxice vă rugăm să cereți urgent sfatul medicului.

Gestație și lactație

Pentru utilizarea în lactație și gestație nu trebuie luate măsuri suplimentare. Ambele substanțe active nefiind clasificate ca embriotoxice și nici teratogenice sau toxice pentru reproducție, cu atât mai puțin sunt de așteptat asemenea efecte pentru cățelele gestante sau în lactație.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

A nu se utiliza zgarda în același timp cu administrarea de alte acaricide și insecticide.



Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi)

Nu există posibilitatea de supradozare, datorită formei farmaceutice.

În studii controlate extinse au fost aplicate câinilor de diferite rase, vârste și greutate, două zgărzi Kiltix zgardă, pentru câini și nu au fost observate semne locale și sistemice de intolerabilitate (chimie clinică, hematologie, colinesteraza, parametri din urina, comportament).

Dacă accidental părți din zgardă sunt mestecate sau înghițite, ar putea să apară simptomele intoxicației cu carbamați cum ar fi salivație, contracții ale pupilelor, vomă sau diaree. În cazul în care apar semne clinice de intoxicație cu carbamați, tratamentul constă în măsuri simptomatice și administrarea intravenoasă de antidot: sulfat de atropină.

Incompatibilități

Nu se cunosc.

12. Perioada de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 60 luni.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: după deschiderea ambalajului, zgarda trebuie să fie aplicată imediat.

13. Statutul legal

Se eliberează fără prescripție veterinară

14. Natura și compoziția ambalajului primar

Kiltix zgardă antiparazitară pentru câini de talie mică

Punga de forma cilindrică din PETP/AVPE sau PETP/PE care conține o zgardă (38cm, 12,5g).
Cutie din carton pliat, căptușită pe interior cu o folie din material compozit din poliester/polietilenă, care conține o punga cu o zgardă și prospect.

Kiltix zgarda antiparazitară pentru câini de talie medie,

Punga de forma cilindrică din PETP/AI/PE sau PETP/PE care conține o zgardă (53cm, 30,2g).
Cutie din carton pliat, căptușită pe interior cu o folie din material compozit din poliester/polietilenă, care conține o punga cu o zgardă și prospect.

Kiltix zgardă antiparazitară pentru câini de talie mare

Punga de forma cilindrică din PETP/AI/PE sau PETP/PE care conține o zgardă (70 cm, 45g).
Cutie din carton pliat, căptușită pe interior cu o folie din material compozit din poliester/polietilenă, care conține o punga cu o zgardă și prospect.

15. Data ultimei revizuirii a textului

10/12/2019

