

PROSPECT

ORNIMIX CLONE B1+H120, liofilizat pentru prepararea suspensiei pentru pui

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripție veterinară:

- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Bioveta, a.s., Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, Republica Cehă

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

ORNIMIX CLONE B1+H120, liofilizat pentru prepararea suspensiei pentru pui

O doză de vaccin conține:

Substanțe active:

Paramyxovirus pseudopestis avium, tulpina Bio 52: NDV B1 min. $10^{6,0}$ EID₅₀ - max. $10^{7,5}$ EID₅₀
Virus bronchitidis infectiosae avium, tulpina Bio 53: IBV H 120 min. $10^{3,0}$ EID₅₀ - max. $10^{4,8}$ EID₅₀

Excipienți:

Nutriment pentru liofilizare: Gelatină, Zaharoză, Apă pentru injecție.

3. INDICAȚII

- pentru imunizarea activă a păsărilor de casă împotriva maladiei aviare Newcastle și bronșitei infecțioase de tipul Massachusetts.
- pentru prevenirea infecțiilor și mortalității cauzate de virusul maladiei Newcastle și virusul bronșitei infecțioase.

Instalarea imunității:

Imunitatea împotriva maladiei Newcastle și bronșitei infecțioase apare nu mai târziu de 14 zile și respectiv 7 zile după prima vaccinare, iar anticorpii materni nu influențează negativ asupra eficacității vaccinării.

Durata imunității:

Imunitatea se menține timp de 6 săptămâni după prima vaccinare prin pulverizare oculară și 4 săptămâni după prima vaccinare orală. După revaccinare, imunitatea persistă cel puțin în decurs de 6 săptămâni. Nivelul imunității contra maladiei Newcastle poate fi evaluat după revaccinare în baza examenului serologic.

4. CONTRAINDICAȚII

Vaccinul se administrează doar păsărilor sănătoase.

A nu se administra păsărilor cu simptome de maladie.



5. REACȚII ADVERSE

Reacțiile post-vaccinare pot apare în particular după administrarea necorespunzătoare a vaccinului prin pulverizare, deoarece stropii mărunți (aerosol) cauzează inhalarea virusului vaccinului în căile respiratorii inferioare și ca urmare cauzează maladii respiratorii.

6. SPECII ȚINTĂ

Păsări domestice - pui

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Aplicarea individuală în aria oculară nazală:

Vaccinul liofilizat se reconstituie într-un solvent steril (de exemplu, soluție pentru injecții). Vaccinul este aplicat cu o pipetă comună pe mucoasa conjunctivală sau nazală la fiecare pasăre în parte; este necesar de a asigura la animale absorbția picăturilor.

Aplicarea pulverizării în masă:

Pentru dizolvarea vaccinului se va utiliza apa distilată sau apa purificată rece fără clor și resturi de fier. Pentru vaccinare se va utiliza dispozitivul special prevăzut pentru acest scop, care formează picături (diametru de la 30 la 100 μm). Pentru puii de o zi, 1000 de doze vor fi dizolvate în volumul de 200-250; ajutorul pulverizatorului trebuie fixat la „pulverizare aspră” astfel încât picăturile mici vor cădea ca o ploaie mărunță. Pentru păsările cu vîrstă mai mare, 1000 de doze sunt dizolvate într-un litru de apă, ajutorul pulverizatorului trebuie fixat la generatorul picăturilor mărunte. Soluția de vaccinare se pulverizează uniform la distanța de la 30 la 50 cm deasupra numărului respectiv de animale la lumină difuză.

Aplicarea în masă în apă potabilă:

Este recomandată vaccinarea puilor din ziua a 4-a după ieșire din ou, pentru a asigura consumul dozei necesare de vaccin din apa potabilă. Vaccinul se administrează dimineața, când păsările sunt suficient de însetate. Vaccinul se administrează (în dependență de vîrstă) fiind dizolvat în cantitatea de apă potabilă care va fi consumată timp de 2 ore.

Re-vaccinarea este repetată la fiecare șase săptămâni după prima administrare în aria oculară nazală sau prin pulverizator și la 4 săptămâni după prima vaccinare per-orală. Vaccinările ulterioare vor fi repetate la fiecare șase săptămâni.

În regiunile cu incidente endemice a maladiei Newcastle, revaccinarea trebuie repetată la interval de 4 săptămâni, prima vaccinare fiind efectuată în aria oculară nazală sau prin pulverizare; înainte de depunerea ouălor trebuie aplicat vaccinul inactivat contra maladiei Newcastle și a bronșitelor infecțioase la păsări.

RECOMANDĂRI REFERITOR LA ADMINISTRAREA CORECTĂ

Conținutul antisepticilor și dizolvanților, prezența clorului și fierului în apa utilizată pentru dizolvarea vaccinului afectează negativ virusul vaccinului și are impact advers asupra eficienței vaccinului. Activitatea virusului poate fi amplificată prin adăugarea laptelui degresat de vacă - 50 ml și/sau lapte praf - 2g/l de soluție de vaccinare. Mecanismul tehnic specificat pentru aplicarea vaccinului, inclusiv locul de adăpat trebuie păstrate în curățenie, bine clătite de detergenți și resturi dezinfectante.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

0 zile

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra în frigider (2 C – 8 C)



