PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

CLORURĂ de SODIU 10%
soluţie injectabilă

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament de uz veterinar deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Numele şi adresa „Medicamentum" SRL, R. Moldova, r. Anenii Noi, s. Merenii Noi
telefon/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39
e-mail: contact@medicamentum.md

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAŢIA ŞI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Substanţa(ele) activă(e):
Clorură de sodiu – 100 mg
Lista excipienţilor:
Apă purificată – până la 1 ml

3. INDICAŢII TERAPEUTICE *(pe specii ţintă)*

Soluţia hipertonică se utilizează la animale în deshidratări (hemoragii, toxicoze), în tratamentul atoniei gastrice la rumegătoare (timpanii cronice, intoxicaţii). Produsul este indicat în hepatopatii şi maladii ginecologice (metrite, vaginite).
La cabaline produsul este indicat în tratamentul colicelor (enteralgii, coprostoze şi meteorism intestinal acut).
Produsul este folosit şi în cazul intoxicaţiilor cu nitrat de argint.

4. CONTRAINDICAŢII

În unele cazuri poate provoca hipotermie şi salivaţie de scurtă durată.
Se administrează cu precauţie la animalele în ultima perioadă de gestaţie, maximum 100 ml (pentru bovine).

5. REACȚII ADVERSE

Produsul este în general bine tolerat şi nu determină reacţii adverse, în condiţiile în care se respect dozajul.

6. SPECII ȚINTĂ

-Pentru toate speciile de animale şi păsări.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ŞI DOZA PRESCRISĂ

Produsul se administrează intravenos lent, în prealabil încălzit pînă la t° + 37°C.

Bovine - 150 - 200 ml/ animal;

Cabaline - 150 - 200 ml/ animal;

Ovine, caprine - 150-300 ml/ animal;

Suine – 50 – 100 ml/animal;

Câini – 10 - 20 ml/ animal.

8. PERIOADA DE AŞTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemîna copiiilor.

A se păstra în loc uscat, răcoros, ferit de lumină.

A nu se utilza după data expirării marcată pe ambalaj.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Nu se cunosc efecte toxice asupra mediului. După golire ambalajele se vor depozita în recipiente de colectare.

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse, trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE *(interdicţii)*

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabiltate în ambalaj original – 24 luni.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar – 10 zile.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

- *se eliberează fără prescripţie veterinară.*

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane 100 ml produs ambalate în grup în cutie de carton, însoţite de prospectul de utilizare.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

27.12.2019

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR