PROSPECT

CLAMOX LC, suspensie intramamara pentru bovine (vaci in lactatie)

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament de uz veterinar deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.

Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripţie veterinară:

-Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane, care îl pot utiliza greşit.

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Detinatorul autorizatiei de comercializare

S.C. CRIDA PHARM S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, Nr. 2, Bloc 101, Ap. 47, Sector 6, Bucureşti, România. Tel./Fax +40 (0)21 430 4399 ;E-mail office@cridapharm.ro

Producator responsabil pentru eliberarea seriilor de produs

S.C. CRIDA PHARM S.R.L Oltenița, Str. Stadionului, Nr. 1, Jud. Călăraşi. Tel/fax: + 40 (0)24 251 5005; E-mail office@cridapharm.ro

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR:

CLAMOX LC, suspensie intramamara pentru bovine (vaci in lactatie)
Amoxicilina , acid clavulanic si prednisolon

DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENŢI

O seringa (3g) contine

Substanţa activă:

Amoxicilina 200 mg (sub forma de amoxicilina trihidrat)

REPUBLICA MOLDOVA
"ZOOFARMAGRO" S.R.L.
MD-2001, mun. Chişinău, str. Cameniţa
IDNO 1002600041804 / TVA 0603423
IBAN MD26FT222490700000218498
B.C. „FinComBank" S.A., suc.nr.7, Chişinau,
c/b FTMDMD2X889
tel.: 022 855-071, 022 855-073, GSM 069827427
zoofarmagro@mail.ru, www.zoofarmagro.md

Acid clavulanic 50 mg (sub forma de clavulanat de potasiu)
Prednisolon 10 mg

3. INDICAŢIE (INDICAATII):

Pentru tratament in cazurile clinice de mastite, inclusiv in cazurile asociate cu infectii cu urmatorii agenti patogeni importanti:
Staflococi (inclusiv tulpinile producatoare de beta-lactamaze).
Streptococi (inclusiv S. agalactiae, S. Dysgalactiae si S. uberis).
Escherichia coli(inclusiv tulpinile producatoare de beta-lactamaze).

4. CONTRAINDICAŢII:

Nu se utilizeaza la animalele cunoscute cu hipersensibilitate la antibiotice beta-lactamice.

5. REACŢII ADVERSE:

Nu se cunosc.
Daca observati orice reactie adversa , chiar si cele care nu sunt deja incluse in acest prospect sau credeti ca medicamentul nu a avut efect va rugam sa informati medicul veterinar.

6. SPECII ŢINTĂ:

Bovine (vaci in lactatie)

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CAI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE:

Conţinutul unei seringi trebuie infuzat în fiecare sfert afectat la nivelul canalului şi sfincterului mamelonar, imediat după mulgerea completă a sfertului, la interval de 12 ore timp de 3 mulsori consecutive.
În cursul tratamentului, evoluţia clinică trebuie evaluată de medicul veterinar.
In cazurile infectiilor cauzate de Staphyloccocus aureus, poate fi nevoie de o durata mai mare de tratament. De aceea durata totala a tratamentului poate fi lasata la decizia medicului veterinar, dar trebuie sa fie indeajuns de lunga pentru a asigura rezolutia completa a infectiei intramamare.

RECOMANDARI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Înainte ca infuzia să fie efectuată, mamelonul trebuie să fie curăţat şi dezinfectat.

8. TIMP DE AŞTEPTARE:

Carne si organe: 7 zile.
Lapte: 84 de ore.

La vacile mulse de două ori pe zi, laptele destinat consumului uman poate fi dat în consum la a 7-a mulsoare după ultimul tratament. În situaţia oricarei alte rutine de muls, laptele poate fi dat pentru consumul uman numai după aceeaşi perioadă de la ultimul tratament (ex. mulsori de 3 ori pe zi, laptele poate fi dat pentru consumul uman la a 11-a mulsoare).

9. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se pastra la temperaturi mai mari de 25^0 C.
A se pastra la loc uscat.
A nu se lasa la vederea si indemana copiilor
A nu se utiliza dupa data expirarii marcata pe etcheta sau cutie :EXP
A se pastra in ambalajul original

10. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ:

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu legislatia in vigoare.

11. ATENŢIONARI SPECIALE:

Atenţionări speciale pentru fiecare specie tinta:
Clamox LC Nu este indicat pentru tratamentul afectiunilor determinate de *Pseudomonas.*
Precauţii speciale pentru utilizare
Precauţii speciale pentru utilizarea la animale
Tamponati varful mamelonului cu un dezinfectant corespunzator inainte de tratament.
Produsul trebuie folosit numai pentru tratamentul mastitei clinice.
Utilizarea produsului trebuie efectuata pe baza informatiilor epidemiologice la nivel local (regional, la nivel de ferma) referitoare la susceptibilitatea bacteriei tinta si luandu-se in considerare politicile antimicrobiene oficiale si locale.
Evitati folosirea produsului in efectivele unde nu au fost izolate tulpini de stafilococi producatoare de beta-lactamaze. Utilizarea necorespunzatoare a produsului poate creste incidenta bateriilor resiztente la antibiotice beta-lactamice si poate diminua eficacitatea tratamentului cu antibiotice beta-lactamice, din cauza potentialului de rezistenta incrucisata

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale
Penicilinele si cefalosporinele pot determina hipersensibilitate (alergie) dupa autoinjectare, inhalare, ingerare sau contact cutanat. Hipersensibilitatea la peniciline

REPUBLICA MOLDOVA
"ZOOFARMAGRO" S.R.L.
MD-2001, mun. Chişinău, str. Cameniţa, 4a,
IDNO 1007600041804 / TVA 0603423
IBAN MD26FT222490700000218498
B.C. „FinComBank" S.A., suc.nr.7, Chisinau,
c/b FTMOMD2X889
tel.: 022 855-071, 022 855-073, GSM 069827427
zoofarmagro@mail.ru, www.zoofarmagro.md

poate determina reactii incrucisate fata de cefalosporine si invers. Ocazional, reactiile alergice la aceste substante pot fi grave.
Nu se va manipula acest produs daca cunoasteti ca sunteti o persoana sensibila sau ati fost avertizat sa nu manipulati astfel de preparate.
Se va manipula acest produs cu mare atentie pentru a preveni expunerea prin luarea tuturor masurilor de precautie recomandate.
Daca apar simptome ca urmare a expunerii la acest produs, cum ar fi: eruptie cutanata, trebuie sa sa solicitati imediat sfatul medicului. Edemele fetei, buzelor sau ochiilor sau dificultati in respiratie sunt simptome mai grave si necesita ingrijire medicala imediata.
Spalati mainile dupa utilizarea acestui produs.

Utilizarea în perioada de gestaţie si lactaţie
Nu se impun precautii speciale.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune
Nu se cunosc.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi) dupa caz
Nu se asteapta aparitia de reactii adverse in caul supradozarii accidentale.

12. PERIOADA DE VALABILITATE
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 18 luni.

13. STATUT LEGAL
Se eliberează în baza prescripției veterinare

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR
Ambalaj:
Ambalaj primar: Seringi din polietilena de joasa densitate continand 3g de suspensie inramamara.
Ambalaj secundar: Cutie de carton care contine 24 seringi.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI
2020

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR