

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Metrizol

soluție spumantă pentru administrare intrauterină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripție veterinară:

- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service”

str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Metrizol, soluție de culoare roșie până la maro, cu miros caracteristic de iod.

1 flacon (45,2 g) conține substanțe active:

iod cristalin - 0,2 g;

iodură de potasiu - 0,4 g.

Excipienți: polietilenglicol 400, lauret-sulfat de sodiu, distearat de zaharoză, cocamidopropilbetaină, hidroxipropilmetilceluloză, refrigerant 134A, apă purificată.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Se administrează, la vaci și iepe în tratamentul formelor subacute și cronice de endometrită, piometrită; a infecțiilor intrauterine postpartum (după acordarea ajutorului obstetric, operație cezariană, îndepărtarea învelitorilor fetale).

4. CONTRAINDICAȚII

A nu se administra la animale cu sensibilitate individuală crescută la componentele preparatului.

5. REACȚII ADVERSE

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect vă rugăm informați medicul veterinar.



6. SPECII ȚINTĂ

Bovine (vacii) și cabaline (iepe).

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Preparatul se administrează intrauterin, cu ajutorul unui cateter de unică folosință, prin acționarea capului de apăsare, care este fixat la flacon, conținutul flaconului se introduce în cavitatea uterină timp de 10-15 secunde. Se administrează o singură dată după o examinare preliminară și masajul rectal al uterului.

În formele severe ale bolii, medicamentul de uz veterinar se administrează de două sau de trei ori cu un interval de 7 zile. În tratamentul piometrului medicamentul de uz veterinar se utilizează într-o cantitate de 2 flacoane per o administrare.

A se agita bine flaconul cu medicamentul de uz veterinar înainte de utilizare. A se efectua sanarea organelor genitale externe și a rădăcinii cozii. La necesitate, a se elibera cavitatea uterină de exudatul inflamator.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Bovine (vacii) și cabaline (iepe): carne și organe – 0 zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Flacoane pentru aerosoli cu o capacitate de 45,2 g cu aplicator de plastic.

A se păstra la loc uscat, întunecat, inaccessibil copiilor, la o temperatură de la 5 până la 25°C. A nu se congela.

A se evita temperaturile ridicate și focul. A nu se lovi, a nu se deschide și a nu se arunca în foc. Termen de valabilitate – 2 ani.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente de uz veterinar trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați de la medicul veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE (interdicții)

Nu se utilizează la animale în perioada de gestație.

După administrarea preparatului nu se masează uterul.

Precauții speciale pentru utilizare

A se agita bine flaconul cu preparat înainte de utilizare.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

A se efectua sanarea organelor genitale externe și a rădăcinii cozii. La necesitate, a se elibera cavitatea uterină de exudatul inflamator.

A nu se administra vacilor în gestație.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:



În timpul utilizării medicamentului de uz veterinar este necesar să se respecte regulile generale de igienă personală și de tehnică a securității prevăzute în timpul lucrului cu medicamentul de uz veterinar.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

13. STATUT LEGAL

- se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane pentru aerosoli cu o capacitate de 45,2 g cu aplicator de plastic.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

09.2020

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

