

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Iodopovidon

Supozitorii pentru administrare intrauterină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripție veterinară:

- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service”

str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

1 supozitor (10 g) conține substanța activă:

iodopovidonă - 1,5 g.

Excipienți: polietilenglicol 115, lauril sulfat de sodiu, stearat de calciu, acid citric, bicarbonat de sodiu, lactoză.

Supozitoare intrauterine.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

La vaci și scroafe, în profilaxia și tratamentul proceselor inflamatorii ale uterului după acordarea ajutorului obstetric, îndepărtarea învelitorilor fetale, avorturi, parturiții complicate și patologice, în endometrite acute postpartum.

4. CONTRAINDICAȚII

Lipsesc.

5. REACȚII ADVERSE:

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect vă rugăm informați medicul veterinar.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine (vacii), porcine (scroafe).

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Înainte de administrarea medicamentului de uz veterinar se efectuează sanarea organelor genitale externe și a rădăcinii cozii. La necesitate se eliberează cavitatea uterină de exudatul inflamator. Supozitorul se introduce în cavitatea uterină cu mâna, îmbrăcată cu o mănușă de unică folosință.



Medicamentul de uz veterinar se administrează intrauterin în doză de un supozitor:

în scop curativ de două ori cu un interval de 24-48 de ore, în cazuri de excepție administrarea medicamentului de uz veterinar se repetă până la însănătoșire;

în scop profilactic o singură dată, imediat după îndepărtarea învelitorilor fetale, avort sau acordarea ajutorului obstetric în parturiții complicate și patologice.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Bovine (vacii), porcine (scroafe): carne și organe – 0 zile.

Lapte –24 ore.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc uscat, întunecat, inaccesibil copiilor, la o temperatură de la 4 până la 20°C.

După deschiderea plicului medicamentul trebuie utilizat imediat.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente de uz veterinar trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați de la medicul veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE (interdicții)

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

A se efectua sanarea organelor genitale externe și a rădăcinii cozii. La necesitate, a se elibera cavitatea uterină de exudatul inflamator.

A nu se administra vacilor în gestație.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul utilizării medicamentului de uz veterinar este necesar să se respecte regulile generale de igienă personală și de tehnică a securității prevăzute în timpul lucrului cu medicamentele de uz veterinar.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

A nu se administra la animalele gestante.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 18 luni.

13. STATUT LEGAL

- se eliberează în baza prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Plicuri din polimeri și/sau folie laminată a câte 1 supozitor.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

09/2020

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

