

Amexa nr. 2

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

FARMASIN-200

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

-Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.

-Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.

-Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

-Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripție veterinară:

-Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. Denumirea și adresa deținătorului certificatului de înregistrare și ale producătorului/fabricantului responsabil pentru eliberarea medicamentului de uz veterinar

Producător: Compania cu răspundere limitată " Soocom Animal Remedy ", Agricultural High & New Tech. Development Zone of Jinan, Republica Popular Chineză.

Distribuitor: "NUTRITFARM" SRL, m. Chișinău, str. Petru Rareș 77, Republica Moldova, office@nutritfort.md; telefon: +37379518904

2. Denumirea medicamentului de uz veterinar, concentrația și forma farmaceutică ale acestuia

2.1 Farmasin-200

2.2 Medicamentul de uz veterinar reprezintă o soluție injectabilă de culoare galbenă.

2.3 1 ml de emulsie injectabilă conține: 200 mg Tilozină, propilen glicol și apă purificată.

3. Indicații terapeutice și farmacologie (pe specie țintă)

3.1 Tilozina este un antibiotic din grupa macrolidelor cu acțiune bacteriostatică asupra bacteriilor Gram-pozitive și Gram-negative, cum ar fi: Campylobacter, Pasteurella, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Treponema spp. and Mycoplasma spp.

3.2 Butafosfanul este un compus organic cu fosfor, utilizat drept sursă de fosfor injectabil la animale, care participă în metabolismul energetic, reface nivelurile serice de fosfor, suportă funcția hepatică și stimulează musculatura netedă și cardiacă. Este important mai degrabă nu pentru acțiunea sa farmacologică ci pentru acțiunea fiziologică pe care o are și toxicitatea redusă. Ciancobalamina (vit. B12) ajută la diverse procese metabolice, în special la formarea de celule roșii din sânge, de asemenea stimulează metabolismul proteinelor, glucidelor și a grăsimilor.


4. Contraindicații

Hipersensibilitate la macrolide și tetraciclone.

NU se recomandă administrarea Farmasin-200 animalelor cu insuficiență renală și hepatică pronunțată.

De asemenea, se interzice administrarea paralelă cu penicilinele, cefalosporinele, quinolonele și cicloserinele.





5. Reacții adverse

După administrarea intramusculară pot apărea reacții locale, dar care dispar în câteva zile. De asemenea, pot apărea dureri epigastrice și iritarea pielii.

6. Specii țintă

6.1 Bovine, ovine, caprine, porcine, câini, pisici.

7. Posologie pentru fiecare specie, metoda, modul de administrare

7.1 Medicamentul Farmasin -200 se administrează intramuscular:

General: 1 ml/10-20 kg greutate corporală timp de 3-5 zile.

8. Timpul de așteptare

8.1 Trebuie sistată administrarea la bovine cu 21 zile înainte de sacrificare, la porcine cu 14 zile înainte de sacrificare. A nu se utiliza la vacile mulgătoare. Nu se cunoaște clar peri-oada de eliminare din organism la vițeei preruminanți. Nu folosiți la vițeei, care se preconizează să fie sacrificați pentru carne de vițel tânăr.

9. Precauții speciale pentru depozitare

9.1 A se feri de acțiunea razelor solare directe, de îngheț și temperaturi mai mari de 35°C. Poate apărea precipitat în flacoane pe fondul temperaturilor scăzute.

10. Precauții speciale pentru eliminarea medicamentului de uz veterinar neutilizat sau a deșeurilor provenite de la medicamentul de uz veterinar

10.1 Medicamentele de uz veterinar fără etichetă, cu termenul de valabilitate expirat, deteriorate sau deschise, trebuie eliminate în conformitate cu cerințele legale în vigoare.

11. Atenționări speciale

11.1 Când lucrați cu medicamentul, trebuie să respectați măsurile de igienă personală și reglementările de siguranță.

12. Termenul de valabilitate

12.1 Termenul de valabilitate este de 3 ani de la data fabricației, în funcție de respectarea condițiilor de depozitare.

13. Statutul legal

13.1 Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. Natura și compoziția ambalajului primar

14.1 Medicamentul este ambalat în flacoane de sticlă brună a câte 50 și 100 ml.

15. Data ultimei revizuirii a textului

21 / 04 /2020



NUMAI PENTRU UZ VETERINAR