

Anexa nr. 2

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

CYPER-VET- 10%

- α - Cipermetrină 10%, 100 mg/ml, concentrat emulsionabil pentru bovine, ovine și câini

Cititi cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastra.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului;
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripție veterinară:

- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. Denumirea și adresa deținătorului certificatului de înregistrare și ale producătorului/fabricantului responsabil pentru eliberarea seriilor medicamentului de uz veterinar:

S.C. Pasteur- FILIALA FILIPEȘTI S.A.
Str. Principală, nr. 944, Filipeștii de Pădure
Jud. PRAHOVA, RO – 11928947
Tel: + 40 021 220 69 20;
Fax: + 40 021 220 69 15;
office@pasteur.ro, www.pasteur.ro

2. Denumirea medicamentului de uz veterinar, concentrația și forma farmaceutică:

CYPER-VET, - α - Cipermetrină 10%, 100 mg/ml, concentrat emulsionabil pentru bovine, ovine și câini.

1 ml concentrat emulsionabil conține:

Substanța activă:

α -Cipermetrină.....100 mg

3. INDICAȚII TERAPEUTICE


CYPER-VET se recomandă la:

- bovine în tratamentul scabiei produsă de *Sarcoptes spp.*;
- ovine în tratamentul scabiei produsă de *Psoroptes spp.*;
- câini pentru combaterea ectoparazitozelor produse de acarieni (*Psoroptes spp.*, *Sarcoptes spp.*, *Chorioptes spp.*) a demodectei și în tratamentul infestațiilor cu căpușe, păduchi, purici.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.





Nu se tratează animalele bolnave, slabe, epuizate sau însetate.

Nu se efectuează tratamente pe timp ploios.

Se va evita contactul direct atât cu medicamentul concentrat cât și cu soluția diluată.

Nu se administrează la animalele cu leziuni cutanate.

5. REACȚII ADVERSE

Rareori se poate observa somnolență la o oră după tratament.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, ovine, câini.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Se utilizează emulsia obținută prin diluarea concentratului emulsionabil CYPER-VET cu apă, în ziua aplicării acesteia. Se administrează prin pulverizări, băi generale sau tratamente locale:

Bovine:

- Scabie: pulverizare pe tot corpul cu o soluție preparată din 1 litru CYPER-VET în 1000 litri apă (100 ppm cipermetrină).
- Scabie: tratament local cu o soluție preparată din 1 litru CIPER-VET în 200 litri apă (500 ppm cipermetrină).

Ovine:

- Scabie: îmbăiere generală – umplerea inițială a băii: 1 litru CYPER-VET în 1000 litri apă (100 ppm cipermetrină).
- Recompletări ale soluției din baie: 1 litru CYPER-VET la 800 litri apă.
- Scabie (tratament local numai în sezonul rece): 1 litru CYPER-VET la 200 litri apă (500 ppm cipermetrină).

Bovine, ovine:

Pentru scabie se fac două tratamente la interval de 10 – 14 zile.

Câini:

Tratamentul se efectuează prin pulverizări generale sau tratamente locale (pensulații):


- Pulverizări: ectoparazitoze produse de căpușe, păduchi și purici: 1 ml la 1 litru apă, două aplicări la interval de 7 zile.
- Tratamente locale (pensulații): râie sarcoptică, demodectie: 12,5 ml la 1 litru apă.

Tratamentul se repetă la 10 – 14 zile.

Observații:

La îmbăiere, pentru obținerea unei soluții omogene de CYPER-VET se procedează astfel: se prepară o soluție din soluția concentrată de CYPER-VET în amestec cu o cantitate de apă cel puțin egală, după care se introduce în bazinul de îmbăiere, completându-se cu cantitatea de apă





necesară. Pentru a se menține concentrația corectă în baie se completează soluția când nivelul volumului a scăzut cu 10%.

Concomitent cu tratamentul cu CYPER-VET recomandăm:

- administrarea de imunostimulatoare și hepatoprotectoare la câinii cu scabie generalizată;
- îndepărtarea crustelor înainte de aplicarea tratamentului;
- efectuarea de examene bacteriologice și micologice pentru un diagnostic diferențiat.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Când se execută pulverizarea se va prepara o cantitate suficientă de soluție pentru asigurarea unei umectări complete a animalului. Pentru a preveni transmiterea ectoparazitozelor este important să se trateze întregul efectiv de animale.

8. TIMP DE AȘTEPTARE

Bovine, ovine: Carne și organe – 3 zile. Lapte – 6 ore.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 25°C.

A se proteja de lumina directă, surse de căldură și foc.

Medicamentul se păstrează în ambalajul original.

A nu se utiliza acest medicament după data expirării marcată pe etichetă.

MEDICAMENTUL CONCENTRAT ESTE INFLAMABIL.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR

Medicamentul este toxic pentru albine și pești.

CYPER-VET concentrat emulsionabil nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă datorită pericolului pentru pești și alte organisme acvatice.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Câinii trebuie împiedicați să se lingă cel puțin 30 minute după tratament.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Câinii sub vârsta de 4 săptămâni după tratament se țin sub observație.

Soluția se utilizează doar în ziua preparării.


Animalele trebuie cufundate complet de 1 – 3 ori (inclusiv capul), iar timpul de îmbăiere să fie de cel puțin 1 minut.

Dacă în interval de 24 de ore după tratament sunt ploi puternice, se poate repeta operațiunea.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

A se purta echipament de protecție corespunzător.





Nociv prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire.

A se evita contactul cu pielea și ochii. În caz de contact cu ochii se spală imediat cu apă și se consultă medicul.

A nu se fuma, bea sau mânca în timpul administrării medicamentului.

Spălați bine mâinile după administrarea medicamentului.

A se păstra departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale.

Foarte toxic pentru organisme acvatic, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la unul dintre componentele medicamentului trebuie să evite contactul cu acesta.

În caz de ingerare accidentală a medicamentului sau alergii provocate de contactul acestuia cu pielea solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul medicamentului sau eticheta.

UTILIZAREA ÎN CAZUL GESTAȚIEI ȘI LACTAȚIEI:

Poate fi utilizat în perioada de gestație și lactație.

INTERACȚIUNI CU ALTE MEDICAMENTE DE UZ VETERINAR SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE:

Nu se cunosc.

SUPRADOZARE:

În cazul supradozării pot apărea reacții ca: salivare abundentă, tremurături și convulsii.

TOXICITATE: Grupa de toxicitate – III.

ANTIDOT: Nu se cunoaște un antidot specific. În caz de intoxicație se instituie tratament simptomatic cu anticonvulsive de tip diazepam. Nu se va administra lapte sau alimente cu grăsimi, întrucât acestea pot mări absorbția cipermetrinei.

INCOMPATIBILITĂȚI:

În absența studiilor de compatibilitate, acest medicament de uz veterinar nu trebuie amestecat cu alte medicamente de uz veterinar.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru comercializare: 2 ani

Perioada de valabilitate după prima deschidere: 12 luni.

Perioada de valabilitate după diluare: max. 24 ore

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacon de sticlă tip III x 20 ml. Flacon de polietilenă tip COEX, PET x 50 ml, 100 ml, 1 l și 5 l.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

01.2016

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

