



PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Biokill 2,5 mg/ml spray cutanat

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripție veterinară:

- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

Bioveta, a.s.

Komenskeho 212

68323 Ivanovice na hane,

Republica Cehă

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Biokill 2,5 mg/ml spray cutanat în calitate de substanță activă conține permetrin și adjuvanți.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Se indică împotriva ectoparaziților (purici, păduchi, căpușe) la câini, cobai, hamsteri și păsări exotice. Se poate folosi și împotriva insectelor (furnici, muște, păianjeni), cât și pentru dezinsecția cuștilor și cuiburilor.

Câini

Purici din familia Pulicidae, genul *Ctenocephalides*, *C.canis* și *C. felis*, păduchi *Linognatus setosus*, acarieni *Ixodes ricinus*, *Haemaphysalis concinna*, *Dermatocentor reticulatus*, *Dermatocentor marginatus*, malofagi *Cheyletiella yasduri* și *Trichodectes canis*.

Cobai

Infestații cu *Ixodes ricinus*, *Haemaphysalis concinna*, *Dermatocentor reticulatus*, *Dermatocentor marginatus*, *Spilopsyllus cuniculi*, *Demodex criceti*, *Notoedres cati*.

Hamsteri

Ixodes ricinus, *Haemaphysalis concinna*, *Dermatocentor reticulatus*, *Dermatocentor marginatus*, *Spilopsyllus cuniculi*, *Demodex criceti*, *Notoedres cati*.





Păsări exotice

Infestații cu *Ixodes ricinus*, *Haemaphysalis concinna*, *Dermatocentor reticulatus*, *Dermatocentor marginatus*, *Argas vulgaris*, *Argas reflexus*, *Ceratophyllus gallinae*, *Knemidocoptes mufans*, *K. pilae*, *Dermanyssus gallinae*.

Prevenirea miazellor și atacul insectelor înțepătoare (dipterelor)

Țîntari: *Culex pipiens*, *Aedes vexans*, *Culicoides obsoletus*, *Culicoides pulicari*.

Muște: *Eusimulium latipes*, *Prosimulium hirtipes*, *Odagmia ornata*, *Musca domestica*, *Stomoxys calcitrans*.

Nimicirea *Tabanus spp.* și *Culicoides spp.*

Biokill 2,5 mg/ml poate fi folosit și pentru prevenirea infestației mediului cu speciile de paraziți menționați mai sus.

4. CONTRAINDICAȚII

A nu se folosi la pisici-este toxic.Preveniți contactul pisicilor cu câinii tratați cu Biokill 2,5mg/ml. Nu se administrează animalelor destinate consumului uman.

5. REACȚII ADVERSE

Salivație excesivă, semne neurologice tranzitorii(iritabilitate, hiperactivitate, tremor muscular), vomă.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini, cobai, hamsteri, păsări exotice.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

A se agita înainte de administrare!

Biokill 2,5 mg/ml se aspersază contra direcției de creștere a blănii sau penajului, pînă la umectarea acestora și a pielii. Animalele cu blană lungă se vor pieptăna simultan. În dependență de dimensiunea animalului și desimea blănii, pînă la umectarea pielii:

10 mg permetrin (4 ml de preparat) per 1 kg corp animal, astfel: 20 aspersări dintr-un ambalaj de 100 ml/ 1 kg corp animal sau 4 aspersări dintr-un ambalaj de 500 ml/1 kg corp animal.

Pentru dezinfecția mediului-pulverizați în cuști, cotețe, grajduri, cuibare pînă la umezire, aproximativ:25 ml/m² (125 aspersări dintr-un ambalaj de 100 ml sau 25 aspersări dintr-un ambalaj de 500 ml). În caz de necesitate prelucrarea se repetă la interval de 1-2 săptămîni.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la T°C sub 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.



10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele D-ră.

Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot folosi greșit.

Se recomandă aspersarea în spații bine aerisite, prepoaratul fiind iritant pentru tractul respirator.

Este recomandată reducerea manipulărilor animalelor pentru 12-24 ore după aplicare și contactul cu copii. Nu dormiți cu animalele tratate! A nu se aspersa în acvarii și heleștee! Este toxic pentru pești, albi, reptile!

12. PERIODA DE VALABILITATE

În ambalajul original al producătorului-2 ani.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacon alb din polietilenă cu pulverizator mecanic a câte 100 și 500 ml.

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI

08.02.2016

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”,

m. Chișinău, str. Camenița 4a

tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

