

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR**Bars^R
spray insectoacaricid**

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO „AVZ S-P”, 141300, Rusia, reg. Moscova, or. Serghiev Posad, str. Ţentralinaia 1

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Bars^R spray insectoacaricid – soluție pentru uz extern.

1 ml de soluție conține: substanță activă fipronil - 3 mg și excipienți.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Bars^R spray insectoacaricid se indică câinilor, pisicilor, dihorilor, la chinchila (șinșila), cobai, șobolani și hamsteri în cazul entomozelor (păduchi malofagi și hematofagi, purici), sarcoptidoze (sarcoptoză, notoedroză), heiletioză și căpușe ixode dar și în scopuri preventive.

4. CONTRAINDICAȚII

Este contraindicat animalelor productive. Sensibilitate individuală sporită la componentele medicamentului, animale bolnave de boli infecțioase, epuizate și în convalescență.

5. REACȚII ADVERSE

La foloșirea conform instrucțiunii date, reacții adverse sau complicații nu apar.

În caz de sensibilitate individuală sporită la componentele medicamentului și apariția complicațiilor (salivație, lăcrimare, vomă) prelucrarea se stopează, animalul se spală cu apă și șampon.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici, dihori, chinchila (șinșila), cobai, șobolani, hamsteri.



7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Doze:

Doza de Bars^R spray insectoacaricid pentru câini, pisici și dihori, în dependență de starea blănii variază de la 0,5 - 1,0 ml/kg masă corp, ceea ce prezintă 2 - 4 aspersări din flaconul de 100 ml și 1 aspersare (1,0 ml) din flaconul de 200 ml.

Rozătoarele afectate de ectoparaziți se prelucrează cu Bars^R spray insectoacaricid în raport de: hamsteri - 0,25 ml/animal, chinchila (șinșila), cobai și șobolani - 0,25 ml/100 g masă corp.

În scop de prevenire a reinvaziei așternutul și alte obiecte de îngrijire se prelucrează, în raport de 2 ml/1 m².

Mod de administrare:

Flaconul se agită bine și ținându-l vertical se aspersează pe suprafața necesară de la distanța de 25-30 cm. O apăsare pe difuzorul flaconului de 200 ml asigură aspersarea unei doze de 1,0 ml, a flaconului de 100 ml - 0,25 ml.

Pentru decontaminarea de insecte și combaterea atacului a căpușelor ixode – se prelucrează toată suprafața corpului animal aplicînd pe piele, ușor umezind blana (la animalele cu blană lungă, smocul se ține cu mîna și se aplică la baza lui). Întru evitarea lîngerii, animalului i se îmbracă botnița. Protejînd ochii animalului cu mîna, se prelucrează pavilioanele urechilor și pieptul, cu vîrfurile degetelor medicamentul ușor se masează în jurul ochilor și a nasului, apoi se prelucrează gîtul, corpul, membrele, abdomenul și coada.

Peste 20 min. după prelucrare, blana se piaptăne și animalul se eliberează de botnița.

Pentru combaterea căpușelor ixode pe suprafața corpului animal, medicamentul se aplică pe locul fixării ei de piele. Dacă timp de 20-30 min. căpușa nu cade, atunci atent se extrage și se distruge.

Cu scop preventiv, prelucrările se efectuează nu mai frecvent de o dată în lună contra insectelor și 1 dată în 14 zile contra căpușelor ixode (pe parcursul sezonului de parazitare).

În notoedroza pisicilor și sarcoptoza cîinilor, medicamentul se aplică pe suprafața afectată eliberată de cruste și 1 cm de țesut limitrof.

Aplicarea se efectuează pînă la umețarea ușoară a suprafeței afectate, de 2 - 4 ori cu interval de 7 - 10 zile, pînă la însănătoșirea animalului ce se adevărește cu două rezultate negative a examenului acarologic de laborator. Animalele afectate cu suprafețe mari, se prelucrează în două etape cu interval de 1 zi, aplicînd mai întîi pe o parte a corpului, apoi pe cealaltă.

Pînă la uscarea totală a blănii se evită lîngerea și apropierea de reșouri electrice și flacără deschisă. A nu se spăla animalele cu șampon sau săpun 3 zile pînă la și 3 zile după prelucrare, în bazine acvatice timp de 48 ore după prelucrare. O prelucrare, oferă protecție animalului de insecte - 1 lună, de căpușe ixode - nu mai puțin de 2 săptămîni.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T⁰C 0⁰C +30⁰C, în locuri inaccesibile copiilor, departe de reșouri electrice și flacără deschisă.



10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu se supun prelucrării căței și dihorii cu vârsta sub 10 săptămîni, rozătoarele sub 2 săptămîni. La animalele cu blana lungă, smocul se ține cu mîna în timp ce soluția se aplică la baza lui.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Pentru evitarea îngerării se îmbracă botniță. Pînă la uscarea totală a blănii se evită lingerea și apropierea de reșouri electrice și flacără deschisă. A nu se spăla animalele cu șampon sau săpun 3 zile pînă la și 3 zile după prelucrare, în bazine acvatice timp de 48 ore după prelucrare. În scop preventiv a reinvăziei așternutul și alte obiecte de îngrijire se prelucrează cu spray în raport de 2 ml/1m². Timp de 3 zile, nu se admite contactul animalului cu suprafețele prelucrate, iar înainte de folosirea ulterioară se spală cu detergent.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Toate manipulările cu medicamentul Bars^R spray insectoacaricid se efectuează folosind mănuși de cauciuc și mască respirator.

E important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar. Persoanelor hipersensibile la componentele medicamentului li se recomandă evitarea contactului direct cu Bars^R spray insectoacaricid. În caz de contact accidental a medicamentului cu pielea, se șterge imediat cu un tampon, cu tunicile mucoase oftalmice, ele se spală din abundență cu apă. În caz de apariție a reacției alergice sau la îngerare, e important de adresat la o instituție medicală cît de repede posibil (cu sine de avut eticheta sau prospectul). În timpul lucrului se interzice fumatul, consumul de alimente și băuturi. La finisarea lucrului mîinile se spală cu apă și săpun. Timp de 24 de ore după prelucrare, nu se permite contactul animalului cu copii.

Utilizarea în perioada de gestație și lactație

Nu se administrează femelelor gestante și în lactație.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

A nu se administra concomitent cu alte medicamente insectoacaricide.

Supradozare

Salivație abundentă, tremor muscular, vomă. În așa caz, medicamentul se spală de pe suprafața corpului, iar animalului i se administrează terapie simptomatică.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.



13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacon din polimer cu difuzor, a câte 100 și 200 ml.

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI

05/2021

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL "Zoofarmagro", mun. Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

