

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

MEGASTOP pentru câini soluție pentru uz extern

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Deținătorul certificatului de înregistrare:

SRL «NPP «SUZIRYA»
str. Poltavskii șleah, 115,
or. Harkov, 61093, Ucraina
telefon / fax: +38 (057) 766-36-36
E-mail: office@priroda.ua

Producătorul produsului finit:

SRL «NPP «SUZIRYA»
str. Zernovaia, 4,
or. Harkov, 61105, Ucraina
E-mail: questions@priroda.ua
Linia directă cu producătorul: 0 (800) 21-23-40

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

MEGASTOP pentru câini

1 ml de medicament conține:

Substanța(e) activă(e):

Imidacloprid – 100 mg;
Ivermectină - 25 mg.

Lista excipienților:

Polietilenglicol-400,
N-metilpirolidonă;
Sulfoxid de dimetil;



O pipetă MEGASTOP pentru câini în raport cu greutatea corporală conține:

<i>Dimensiunea pipetei</i>	<i>Volumul (ml)</i>	<i>Imidacloprid (mg)</i>	<i>Ivermectină (mg)</i>
Pentru câini de talie mică cu o greutate corporală până la 4 kg	0,5	50	12,5
Pentru câini de talie medie cu o greutate corporală de la 4 până la 10 kg	1,0	100	25
Pentru câini de talie mare cu o greutate corporală de la 10 până la 20 kg	2,0	200	50
Pentru câini de talie gigantă cu o greutate corporală de la 20 până la 30 kg	3,0	300	75

Soluție pentru uz extern, aplicare spot-on.

Lichid uleios transparent cu miros specific al componentelor.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Prevenirea și tratamentul animalelor afectate de purici (*Ctenocephalides spp.*), acarieni sarcoptiformi (*Otodectes cynotis*, *Notoedres cati*, *Sarcoptes canis*), acarieni trombidiformi *Demodex spp.*; prevenirea dirofilariozei (eficient împotriva stadiilor larvare L3 și L4 de *Dirofilaria immitis*).

4. CONTRAINDICAȚII

Nu se aplică la căței sub vârsta de 10 săptămâni.

Nu se aplică animalelor cu hipersensibilitate la componentele medicamentului.

Nu se aplică câinilor de rase Collie, Sheltie, Bobtail și hibrizilor lor.

Tratamentul animalelor bolnave și slăbite și cu o greutate de până la 1 kg trebuie să se bazeze pe evaluare a riscurilor și necesitatea tratamentului.

5. REACȚII ADVERSE

După aplicarea medicamentului la animale uneori apar simptome de efecte secundare, cum ar fi mâncărime pe termen scurt, eritem pe piele, semne de păr gras, care trec repede.

Atunci când animalele ling medicamentul după aplicare, poate apărea o salivare crescută și vomă,

și semne de tulburări nervoase. Aceste tulburări trec rapid fără terapie.

În cazuri foarte rare, efectul medicamentului poate provoca modificări ale comportamentului, cum ar fi apatia, agitația și pierderea apetitului.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini



7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

În raport cu greutatea corporală a câinelui, se utilizează pipeta cu volum corespunzător:

Greutate corporală (kg)	Dimensiunea pipetei	Volumul (ml)	Numărul de pipete
Până la 4	pentru câini de talie mică	0,5	1
De la 4 până la 10	pentru câini de talie medie	1,0	1
De la 10 până la 20	pentru câini de talie medie	2,0	1
De la 20 până la 30	pentru câini giganți	3,0	1
De la 30 și mai mult		O combinație corespunzătoare de pipete	

Mod de administrare:

Medicamentul este administrat numai extern. Câinii sunt tratați într-o poziție în picioare. Desfaceți blana între omoplații astfel încât pielea să fie vizibilă și aplicați medicamentul pe pielea nedeteriorată. Puneți capătul îngust al pipetei pe piele, apăsați pipeta strâns de mai multe ori, aplicați întregul conținut pe piele.

Câiniilor giganți cu greutatea corporală mai mult de 20 kg conținutul pipetei se aplică în 3-4 puncte de-a lungul coloanei vertebrale, începând între omoplații și terminând în apropierea rădăcinii cozii.

Nu scăldați animalele timp de 48 de ore după tratament. Durata acțiunii medicamentului este de 1,5-2 luni.

În caz de otodectoze, notoedroze, sarcoptoze și demodecoze, tratamentul se efectuează de 2-3 ori, cu un interval de 10 zile.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Depozitați medicamentul într-un loc uscat, întunecat, separat de alimente și furaje, inaccesibil copiilor și animalelor, la o temperatură cuprinsă între 0 și 30 °C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare.



11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

În timpul prelucrării animalului să nu se permită pătrunderea medicamentului în ochi și cavitatea bucală.

A nu se administra pe cale orală.

Animalele tratate recent nu trebuie lăsate să se lingă.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Medicamentul se aplică numai pe pielea sănătoasă.

Îmbăierea animalelor cu utilizarea șamponului după tratament reduce eficacitatea medicamentului.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul manipulării medicamentului, proprietarii animalelor trebuie să respecte regulile generale de igienă și siguranță, prevăzute în timpul lucrului cu medicamente de uz veterinar.

În cazul contactului accidental al medicamentului cu pielea, membranele mucoase sau ochi, este necesar să le spălați bine cu apă curgătoare.

Proprietarii animalelor cu hipersensibilitate la componentele medicamentului ar trebui să trateze animalele cu mănuși de cauciuc.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Utilizarea medicamentului în timpul gestației și lactației se bazează pe o evaluare a riscului și necesitatea tratamentului de către un medic veterinar.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

A nu se utiliza concomitent cu alte antiparazitare lactone macrociclice.

Supradozare

În cazul unei supradoze de medicament de 10 ori la pisicile adulte și de 5 ori la pisoiși, nu au fost observate simptome de supradozare.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate – 36 (XXXVI) luni de la data fabricației, sub rezerva respectării regulilor de depozitare.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fara prescripție veterinară.



14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Pipete polimerice:

Pentru câini de talie mică cu o greutate corporală până la 4 kg - 0,5 ml

Pentru câini de talie medie cu o greutate corporală de la 4 până la 10 kg - 1,0 ml

Pentru câini de talie mare cu o greutate corporală de la 10 până la 20 kg - 2,0 ml

Pentru câini de talie gigantă cu o greutate corporală de la 20 până la 30 kg - 3,0 ml

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

03.2021

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

