

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Diclacox

Premix pentru furaj medicamentat

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
 - Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
 - Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
 - Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.
 - Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră.
- Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

AVE&VETMEDIC DOO

Belgrad

Bregalnička 32, 26300 Vršac

Serbia

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Diclacox

Diclazuril

Premix pentru furaj medicamentat.

1 g de Premix pentru furaj medicamentat conține:

Substanța activă:

Diclazuril - 5 mg

Excipienți:

Parafină lichidă ușoară – 10 mg

Făină de soia – până la 1,0 g

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Tratamentul și profilaxia coccidiozei la puii de găină cauzată de: *Eimeria acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. mitis*, *E. necatrix*, *E. tenella*.

Tratamentul și profilaxia coccidiozei la puii de curcă cauzată de: *Eimeria adenoides*, *E. gallapavonis*, *E. meleagridis*.

Tratamentul și profilaxia coccidiozei la iepuri cauzată de: *Eimeria irresidua*, *E. media*, *E. flavescens*, *E. intestinalis*, *E. perforans*, *E. piriformis*, *E. stiedai*, *E. magna*.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează găinilor ouătoare.



5. REACȚII ADVERSE

Nu sunt cunoscute.

6. SPECII ȚINTĂ

Pui de carne, pui înlocuitori de găini ouătoare cu vârsta de până la 16 săptămâni, pui de curcă pentru îngrășare cu vârsta până la 12 săptămâni, iepuri.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Medicamentul se administrează pe cale orală, încorporat în furaj, la o concentrație de 1 ppm.

În scop terapeutic:

Păsări, iepuri: Se amestecă 200 g medicament la 1 tonă de furaj finit.

Pentru un amestec omogen, cantitatea necesară de medicament se amestecă mai întâi cu o cantitate mică de furaj și apoi se continuă mixarea furajului finit. Furajul medicamentat se administrează timp de 3 zile.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne și organe:

Păsări: 0 zile; Iepuri: 1 zi.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea sau la îndemâna copiilor.

A se păstra în ambalajul primar, la temperaturi de până la 25° C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Nu se administrează puilor înlocuitori de găini ouătoare cu vârsta mai mare de 16 săptămâni și puilor de curcă pentru îngrășare cu vârsta mai mare de 12 săptămâni.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

La manipularea medicamentului sau prepararea furajului se vor utiliza mijloace individuale de protecție (ochelari de protecție, mănuși, haine de protecție etc.). În caz de contact direct cu pielea, clătiți bine pielea cu apă.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune

Nu se va combina cu alte coccidiostatice.



Supradozare

Păsările au tolerat bine supradozarea, în urma administrării unei doze de diclazuril de până la 25 ori mai mare decât doza recomandată. Simptomele de intoleranță, fie clinice sau economice, nu au fost observate la curci după administrarea diclazuril în doze de 100 de ori mai mari decât cele recomandate.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Nu se administrează găinilor ouătoare.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Termenul de valabilitate – 3 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere – 28 zile.

Perioada de valabilitate după amestecare în furaj: 28 zile la temperatura de până la 25°C.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Ambalaj interior și exterior: folie laminată de aluminiu (PET / AL / PE) 100 g, 1 kg

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

10/2021

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

