



REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Diclacox

Diclazuril

2. COMPOZITIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 g de Premix pentru furaj medicamentat conține:

Substanța activă:

Diclazuril - 5 mg

Excipienți:

Parafină lichidă ușoară – 10 mg

Făină de soia – până la 1,0 g

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Premix pentru furaj medicamentat

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii-țintă:

Pui de carne, pui înlocuitori de găini ouătoare cu vârsta de până la 16 săptămâni, pui de curcă pentru îngrășare cu vârsta până la 12 săptămâni, iepuri.

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă

Tratamentul și profilaxia coccidiozei la puii de găină cauzată de: *Eimeria acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. mitis*, *E. necatrix*, *E. tenella*.

Tratamentul și profilaxia coccidiozei la puii de curcă cauzată de: *Eimeria adenoides*, *E. gallapavonis*, *E. meleagridis*.

Tratamentul și profilaxia coccidiozei la iepuri cauzată de: *Eimeria irresidua*, *E. media*, *E. flavescens*, *E. intestinalis*, *E. perforans*, *E. piriformis*, *E. stiedai*, *E. magna*.

4.3 Contraindicații:

Nu se administrează găinilor ouătoare.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu sunt.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Nu se administrează puilor înlocuitori de găini ouătoare cu vârsta mai mare de 16 săptămâni și puilor de curcă pentru îngrășare cu vârsta mai mare de 12 săptămâni.



4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

La manipularea medicamentului sau prepararea furajului se vor utiliza mijloace individuale de protecție (ochelari de protecție, mănuși, haine de protecție etc.). În caz de contact direct cu pielea, clătiți bine pielea cu apă.

4.6 Reacții adverse

Nu sunt cunoscute.

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu se administrează găinilor ouătoare.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se va combina cu alte coccidiostatice.

4.9 Doză și calea de administrare

Medicamentul se administrează pe cale orală, încorporat în furaj, la o concentrație de 1 ppm.

În scop terapeutic:

Păsări, iepuri: Se amestecă 200 g medicament la 1 tonă de furaj finit.

Pentru un amestec omogen, cantitatea necesară de medicament se amestecă mai întâi cu o cantitate mică de furaj și apoi se continuă mixarea furajului finit.

Furajul medicamentat se administrează timp de 3 zile.

4.10 Supradozare

Păsările au tolerat bine supradozarea, în urma administrării unei doze de diclazuril de până la 25 ori mai mare decât doza recomandată. Simptomele de intoleranță, fie clinice sau economice, nu au fost observate la curci după administrarea diclazuril în doze de 100 de ori mai mari decât cele recomandate.

4.11 Perioada de așteptare

Carne și organe:

Păsări: 0 zile; Iepuri: 1 zi.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE:

5.1 Proprietăți farmacodinamice:


5.1.1 Grupa farmacoterapeutică:

Codul ATC: QP51AJ03

Agenti împotriva bolilor protozoice, triazine.

Diclazurilul este un remediu cu acțiune coccidiostatică, care este utilizat ca aditiv furajer în prevenția și tratamentul coccidiozei la păsări cauzate de coccidia din genul *Eimeria*. Diclazurilul este activ împotriva schizontilor (a doua generație) de *E. tenella*, *E. mitis* și *E. necatrix*; merozoizilor și gamonților de *E. bruneti*; zigoților în *E. maxima* și împotriva ambelor stadii sexuale și asexuale ale *E. tenella*.

Mecanismul de acțiune încă nu este pe deplin cunoscut.



5.2 Proprietăți farmacocinetice

După administrarea orală, concentrațiile maxime de diclazuril în plasma păsărilor sunt atinse după 6 ore de la administrare.

Diclazurilul se distribuie uniform în organele parenchimatoase și cantitativ mai puțin în mușchi.

Concentrația diclazurilului în mușchi și organele viscerele este foarte scăzută și scade rapid după câteva zile. Timpul de înjumătățire constituie 50 de ore la puii de găină și 38 de ore la puii de curcă. Este eliminat preponderent prin fecale.

Proprietăți referitoare la mediul înconjurător

Dacă este utilizat în conformitate cu instrucțiunile recomandate, medicamentul nu prezintă un pericol pentru mediul înconjurător.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților

Parafină lichidă ușoară, făină de soia.

6.2 Incompatibilități

Nu se va combina cu alte coccidiostatice.

6.3 Perioada de valabilitate:

Termenul de valabilitate – 3 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere – 28 zile.

Perioada de valabilitate după amestecare în furaj: 28 zile la temperatura de până la 25°C.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

A nu se lăsa la vederea sau la îndemîna copiilor.

A se păstra în ambalajul primar, la temperaturi de până la 25° C.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Ambalaj interior și exterior: folie laminată de aluminiu (PET / AL / PE) 100 g, 1 kg.

6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE

AVE&VETMEDIC DOO, Serbia

7. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE

210096

8. DATA CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE

11/10/2021

9. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

10/2021

