Anexa Nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

SURFAGON
Soluţie injectabilă

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament de uz veterinar deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane, care îl pot utiliza greşit.

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Mosagrogen SA, Rusia
г. Москва, проезд Дорожный 1-й, дом 1, строение 1.
Telefon/fax: +7(495)744-0645;
e-mail: mag@mosagrogen.ru

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAŢIA ŞI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Surfagon

Într-un ml se conţine:
Substanţa activă:
Alarelin acetat - 5µg

Excipienţi:
Clorură de sodiu, nipagină şi apă injectabilă.

Soluţie injectabilă.
Soluţie transparentă, incoloră sau cu nuanţă gălbuie.

REPUBLICA MOLDOVA S.R.L. "FEMAX NORD" IDNO 1010600022873 SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

3. INDICAŢII TERAPEUTICE

Surfagon este utilizat pentru:
- inducerea precoce a ciclului sexual;
- tratamentul hipofuncţiei şi chisturilor foliculare ovariene;
- prevenirea mortalităţii embrionare precoce;
- creşterea fertilităţii la femele.

4. CONTRAINDICAŢII

Nu se administrează la animale cu hipersensibilitate individuală crescută la componentele medicamentului.
Este interzisă administrarea medicamentului la animalele gestante şi imature.

5. REACŢII ADVERSE

Când utilizaţi Surfagon în conformitate cu prospectul de utilizare, efectele secundare şi complicaţiile nu sunt de obicei observate.
În caz de reacţii alergice, utilizarea medicamentului este oprită şi animalelor sunt prescrise medicamente antihistaminice şi simptomatice.

6. SPECII ŢINTĂ

Vaci, scroafe.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ŞI DOZA PRESCRISĂ

Pentru inducerea timpurie a ciclului sexual la vaci, Surfagon se administrează o dată în doză de 50 µg în a 8-12-a zi după fătare. Îndiferent când apar căldurile, animalele sunt inseminate nu mai devreme de 60 de zile după fătare.

Pentru tratamentul unei forme uşoare de hipofuncţie ovariană la vaci, Surfagon este injectat de două ori: prima dată - în a 8-12-a zi a ciclului sexual, o doză de 50 µg, repetat, după 10 zile, aceeaşi doză.

Cu o formă mai pronunţată de hipofuncţie ovariană, în zilele 1, 3 şi 5, se injectează intramuscular 10 ml soluţie uleioasă progesteron de 1%, iar în a 7-a zi - Magestrofan® în doză de 2 ml şi Surfagon 50 µg, Animalele sunt inseminate pe măsura intrării acestora în călduri.

Pentru tratamentul chisturilor foliculare, Surfagon se administrează de trei ori cu un interval de 24 de ore. Vacilor în doză de 20-25 µg, juncilor 15-20 µg. Vacilor se poate administra intravenos o singură doză de 50 µg. În a 11-13-a zi după prima injecţie a medicamentului, se administrează intramuscular o doză de 2 ml de Magestrofan®. Animalele sunt inseminate pe măsură intrării acestora în călduri.

După două sau mai multe inseminări infertile la vaci, în a 11-a zi după ultima intrare a acestora în călduri, li se injectează intramuscular o doză de 2 ml de Magestrofan®, apoi, după aproximativ 70 de ore, li se administrează o doză de 50 µg Surfagon. Animalele sunt inseminate pe măsură intrării în călduri. Vacile care nu au intrat în călduri sunt tratate din nou cu Surfagon în doză de 50 µg. Animalele care au intrat în călduri sunt inseminate.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Pentru a preveni mortalitatea embrionară timpurie la vaci, la 3, 5 şi 9 zile după inseminare se administrează Surfagon în doză de 20-25 μg.

Pentru a creşte fertilitatea şi a sincroniza ovulaţia, scroafele sunt injectate cu 600-800 UI de Follimag® după 24-48 de ore de la înţărcarea purceluşilor. După detectarea căldurii, înainte de inseminare se administrează Surfagon în doză de 10 μg. Scroafele sunt inseminate conform instrucţiunilor.

Pentru a stimula dezvoltarea organelor de reproducere a scroafelor pentru reproducere, înainte de inseminarea planificată cu 60 şi 30 de zile, utilizaţi Surfagon a câte 10 μg sau 1 doză Pigulin * per animal.

* Într-o doză de Pigulin se conţine: Gonadotropina serică ecvină (PMSG) - 400 UI, foliculostimulant (FSH); Gonadotropină corionică umană (hCG) - 200 UI, luteinizant (LH).

8. PERIOADA DE AŞTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra medicamentul în ambalajul sigilat al producătorului într-un loc protejat de lumina directă a soarelui, separat de alimente şi furaje, la o temperatură cuprinsă între 5 ° C şi 25 ° C. Surfagon nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor.

10. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul neutilizat este eliminat în conformitate cu cerinţele legale.

11. ATENŢIONĂRI SPECIALE

Atenţionări speciale pentru fiecare specie-ţintă:

Particularităţile acţiunii medicamentului la prima utilizare şi la retragerea lui nu au fost stabilite.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale:

În caz dacă intervalul între două administrări a medicamentului a fost mărit, aceasta trebuie efectuată cât mai curând posibil în aceeaşi doză şi aceeali schemă.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul manipulării medicamentului, să recomandă respectarea regulilor generale de igienă personală şi a măsurilor de siguranţă, prevăzute în timpul lucrului cu medicamente.

Persoanele cu hipersensibilitate la componentele medicamentului trebuie să evite contactul direct cu Surfagon.

Nu mâncaţi, nu consumaţi băuturi şi nu fumaţi în timp ce manipulaţi medicamentul.

La finisarea lucrului, mâinile trebuie spălate cu apă caldă şi săpun.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun.Chișinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Flacoanele goale a medicamentului sunt interzise pentru utilizare în scopuri casnice, ele trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere.
În caz de contact accidental al medicamentului cu pielea sau membranele mucoase ale ochilor, acestea trebuie clătite cu multă apă.
În caz de reacții alergice sau ingestie accidentală a medicamentului în organismul uman, trebuie să contactați imediat o instituție medicală (ar trebui să aveți prospectul de utilizare a medicamentului sau eticheta).

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:
Medicamentul poate fi utilizat la vaci în termen de 9 zile de la inseminarea artificială, în perioada ulterioară de sarcină, utilizarea medicamentului este interzisă. Medicamentul este interzis pentru utilizare la scroafe gestante, precum și la animale tinere.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:
Surfagon nu poate fi amestecat în aceeași seringă cu alte medicamente.

Supradozare
Nu s-au observat cazuri de supradozare cu Surfagon.

12. PERIOADA DE VALABILITATE
Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: a se utiliza imediat.
Nu utilizați medicamentul după data de expirare.

13. STATUT LEGAL
Surfagon se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR
Surfagon este ambalat în flacoane de sticlă a câte 10 și 100 ml, sigilate cu dopuri de cauciuc, acoperite cu capace din aluminiu.
Flacoanele de 10 ml sunt ambalate în cutii de carton de 20 buc.
Fiecare ambalaj este furnizat cu prospect de utilizare.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI
10/2021

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR