

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

DEZY SPRAY

soluție pentru uz extern

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
 - Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
 - Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
 - Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.
 - Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră.
- Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service”

str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina

tel. / fax: (0432) 55-14-28, (0432) 55-14-27

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

DEZY SPRAY

100 ml de medicament conține:

Substanța activă:

Clorhidrat de oxitetraciclină - 2,5 g

Violet de gențiană - 0,5 g

Excipienți: polisorbat 80, glicerină, alcool izopropilic, apă distilată.

Spray pentru uz extern.

Soluție de culoare violetă.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE (pe specii țintă)

Dezy spray este indicat în tratamentul sau prevenirea infecțiilor cutanate produse de germeni sensibili la acțiunea oxitetraciclinei la câini și pisici. În tratamentul plăgilor traumatice și chirurgicale (inclusiv după castrare, amputarea urechilor sau cozilor), dermatită interdigitală, piodermite, eczeme, zgâriere, mușcături, contuzii, ulcere și abcese deschise de diferite etiologii sensibile la oxitetraciclină.



4. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

5. REACȚII ADVERSE

Nu sunt.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini și pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Aplicarea topică externă.

Înainte de a fi aplicat medicamentul, curățați zona afectată de corpuri străine, exudat, țesuturi necrotizate.

Recomandări privind administrarea corectă:

Flaconul trebuie agitat bine înainte de utilizare. Medicamentul se pulverizează la o distanță de 8 - 12 cm de la suprafața plăgii, pistonul de pulverizare se apasă de 5 ori (doza 0,5 ml) în cazul utilizării flaconelor cu conținut de 50-200 ml sau o singură dată (doza de 0,5 ml) în cazul utilizării flacoanelor cu conținut de 500 ml.

Se aplică la fiecare 12 ore până la recuperare completă a animalului.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

În loc uscat, ferit de lumină, plasat la temperaturi de la +5 până la +25° C.

A nu se păstra cu alimente, băuturi și hrana pentru animale.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

Aceste măsuri contribuie la protecția mediului. Medicamentul nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă datorită pericolului pentru pești și alte organisme acvatice. Nu contaminați lacurile cursurile de apă sau canalizarea cu medicamentul sau cu ambalajul acestuia.



11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Numai pentru uz extern.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Agitați flaconul înainte de utilizare.

A nu se administra în jurul ochilor, a se evita nimerirea medicamentului în ochii animalelor.

A nu se permite animalului să lingă medicamentul timp de cinci minute după aplicare.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Datorită riscului de sensibilitate și de apariție a dermatitei de contact, utilizatorul trebuie să evite contactul cu pielea. La manipularea medicamentului de uz veterinar trebuie purtate mănuși impermeabile de protecție.

Datorită riscului de iritație oftalmică, se va evita contactul medicamentului cu ochii. Se va proteja fața și ochii.

Nu pulverizați pe flacără sau pe materiale incandescente.

Nu înțepați sau ardeți flaconul după utilizare.

Evitați să inhalați vaporii.

Spălați mâinile după utilizare.

Nu mâncați și nu fumați în timpul administrării medicamentului.

În caz de ingestie sau contact accidental cu ochii, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului eticheta.

Utilizare în perioada de gestație și alăptare:

Se permite utilizarea medicamentului în perioada de gestație și alăptare.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se cunosc.

Supradozare:

În cazul utilizării prelungite, poate apărea hipersensibilitate la medicament, care dispare de la sine după anularea acestuia.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 24 luni.

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar după prima deschidere a ambalajului primar: 1 an.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.





14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane din sticlă și/sau polimer cu pulverizator a câte 50, 100, 200 și 500 ml.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

10/2021

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

