

**REZUMATUL CARACTERISTICILOR
MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR**
DEZY SPRAY**2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ**

100 ml de medicament conține:

Substanța activă:

Clorhidrat de oxitettraciclină - 2,5 g

Violet de gențiană - 0,5 g

Excipienți: polisorbat 80, glicerină, alcool izopropilic, apă distilată.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Spray pentru uz extern.

Soluție de culoare violetă.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE**4.1 Specii-țintă:**

Câini și pisici.

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă

Dezy spray este indicat în tratamentul sau prevenirea infecțiilor cutanate produse de germeni sensibili la acțiunea oxietetraciclinei la câini și pisici. În tratamentul plăgilor traumatiche și chirurgicale (inclusiv după castrare, amputarea urechilor sau cozilor), dermatită interdigitală, piodermite, eczeme, zgâriere, mușcături, contuzii, ulcere și abcese deschise de diferite etiologii sensibile la oxitettraciclină.

4.3 Contraindicații:

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Numai pentru uz extern.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare**4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:**

Agitați flaconul înainte de utilizare.

A nu se administra în jurul ochilor, a se evita nimerirea medicamentului în ochii animalelor.

A nu se permite animalului să lingă medicamentul timp de cinci minute după aplicare.





4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Datorită riscului de sensibilitate și de apariție a dermatitei de contact, utilizatorul trebuie să evite contactul cu pielea. La manipularea medicamentului de uz veterinar trebuie purtate mănuși impermeabile de protecție.

Datorită riscului de iritație oftalmică, se va evita contactul medicamentului cu ochii. Se va proteja fața și ochii.

Nu pulverizați pe flacără sau pe materiale incandescente.

Nu înțepați sau ardeți flaconul după utilizare.

Evitați să inhalați vaporii.

Spălați mâinile după utilizare.

Nu mâncați și nu fumați în timpul administrării medicamentului.

În caz de ingestie sau contact accidental cu ochii, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului eticheta.

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate):

Nu sunt.

4.7 Utilizare în perioada de gestație și alăptare:

Se permite utilizarea medicamentului în perioada de gestație și alăptare.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se cunosc.

4.9 Doză și calea de administrare

Aplicarea topică externă.

Înainte de a fi aplicat medicamentul, curățați zona afectată de corpii străini, exudat, țesuturi necrotizate.

Recomandări privind administrarea corectă:

Flaconul trebuie agitat bine înainte de utilizare. Medicamentul se pulverizează la o distanță de 8 - 12 cm de la suprafața plăgii, pistonul de pulverizare se apasă de 5 ori (doza 0,5 ml) în cazul utilizării flaconelor cu conținut de 50-200 ml sau o singură dată (doza de 0,5 ml) în cazul utilizării flacoanelor cu conținut de 500 ml.

Se aplică la fiecare 12 ore până la recuperare completă a animalului.

4.10 Supradozare:

În cazul utilizării prelungite, poate apărea hipersensibilitate la medicament, care dispare de la sine după anularea acestuia.

4.11 Perioada de așteptare:

Nu este cazul.



5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice:

5.1.1 Grupa farmacoterapeutică: antibiotice de uz topic oxitetraciline.

Codul veterinar ATC: QD06AA03

5.1.2 Mecanism de acțiune

Oxitetraciclina este un antibiotic bacteriostatic, al cărui mecanism de acțiune este de a perturba sinteza proteinelor ribozomului, precum și de a reduce permeabilitatea membranei citoplasmatică a microorganismelor sensibile.

Violet de gențiană aparține grupului de derivați de rosanilină, care aparține coloranților medicinali cu efect antiseptic pronunțat. Acțiunea sa antimicrobiană și antifungică împotriva *Staphylococcus spp.*, *Candida spp.* se bazează pe capacitatea de a perturba reacțiile de oxidare în celulele microorganismelor.

Efectul astringent al violetului de gențiană se exprimă în acțiunea asupra metabolismului hidrosalin și tisular în țesuturile deteriorate. Acest lucru duce la o scădere a hidratării, blocând pătrunderea microflorei patogene și a produselor activității sale vitale din zona țesuturilor moarte în cele sănătoase, restabilind microcirculația sângelui și, ca urmare, accelerând regenerarea zonelor deteriorate.

5.1.3 Efecte farmacodinamice

Combinăția de clorhidrat de oxitetraciclina și violet de gențiană are un efect bactericid pronunțat și acțiune bacteriostatică asupra agenților patogeni, decât fiecare substanță luată separat, oferind un efect terapeutic ridicat.

5.1.4 Eficacitate și siguranță clinică

Medicamentul are un spectru larg de acțiune împotriva organismelor gram-pozitive și gram-negative: *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Bordetella*, *Clostridium spp.*, *Haemophilus spp.*, *E. coli*, *Pasteurella spp.*, *Proteus spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Salmonella spp.*, *Campylobacter*, precum protozoare, micoplasme (*Mycoplasma spp.*), *Rickettsia (Rickettsia spp.)* și *Chlamydia (Chlamydia)*.

Dezy spray soluție pentru uz extern, prezintă o înaltă eficiență și siguranță de utilizare, poate fi cu ușurință administrat în orice condiții. Aceste aspecte diminuează în sine costul măsurilor de tratament, precum și riscurile de apariție a reacțiilor adverse.

5.2 Proprietăți farmacocinetice

Administrată local oxitetraciclina este rapid absorbită prin suprafața plăgii, creând o concentrație terapeutică în țesutul afectat după 30-40 de minute și se păstrează 8-10 ore.

6.1 Lista excipienților:

Polisorbat 80, glicerină, alcool izopropilic, apă distilată





6.2 Incompatibilități:

Nu se cunosc.

6.3 Perioada de valabilitate:

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 24 luni.

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar după prima deschidere a ambalajului primar: 1 an.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

În loc uscat, ferit de lumină, plasat la temperaturi de la +5 până la +25° C.

A nu se păstra cu alimente, băuturi și hrana pentru animale.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar:

Flacoane din sticlă și/sau polimer cu pulverizator a câte 50, 100, 200 și 500 ml.

6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

Aceste măsuri contribuie la protecția mediului. Medicamentul nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă datorită pericolului pentru pești și alte organisme acvatice. Nu contaminați lacurile, cursurile de apă sau canalizarea cu medicamentul sau cu ambalajul acestuia.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service”

str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, Ucraina, 23500

tel.: +38 (043) 442-12-54, fax: +38 (043) 442-17-87

e-mail: vet@olkar.com.ua, www.agroolkar.com.ua

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

210100

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

29.10.2021

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

10/2021

