Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Soluţie glucoză 40%
soluţie injectabilă

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiţi acestmedicament de uz veterinar deoarece conţine informaţii importante pentru Dumneavoastră.
-Păstraţi acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
-Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului veterinar sau farmacistului.
-Dacă s-au manifestat orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
-Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.
OOO "Brovafarma", Ucraina , or. Brovarî, bul. Nezavisimosti 18a, 07400

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAŢIA ŞI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA
Soluţie glucoză 40% injectabilă- soluţie transparentă, incoloră sau pal - gălbuie cu gust dulciu.
1 ml conţine în calitate de substanţă activă:
Glucoză anhidra - 400,0 mg şi apă apirogenă până la 1ml.

3. INDICAŢII TERAPEUTICE
Soluţie glucoză 40% se indică în cazul bolilor cu disfuncţii a sistemului nervos central (inhibiţie-excitaţie), dereglarea inervaţiei vegetative, în cazul bolilor infecţioase acute şi bolilor hemoparazitare, în diferite forme a insuficienţei cardiace, hipotensiune, hemoragii semnificative. Se administrează soluţiile de glucoză în cazul toxiinfecţiilor, intoxicaţiilor cu substanţe narcotice, mercur, arsenicum, stricnină, nitrit de sodiu şi alte substanţe; în cazul edemelor pulmonare; în patologiile ficatului (hepatite şi ciroză), insuficienţă diuretică; în acetonemii, în hemoglobinurii postpartum la vaci, în cetonurii şi toxemiile vacilor mulgătoare, cetonuria oilor, contracţii slabe a uterului, pareză puerperală; în calitate de remediu hemostatic în cazul hemoragiilor pulmonare, a tractului digestiv şi alte hemoragii interne, în diateză hemoragică. În soluţiile de glucoză se diluează unele preparate cu scopul diminuării toxicităţii sau prolongării acţiunii.

4. CONTRAINDICAŢII
A nu se utiliza în caz de hiperglicemie.

5. REACŢII ADVERSE
În doze terapeutice (conform instrucţiunii date) nu provoacă reacţii adverse.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

6. SPECII ŢINTĂ

Bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, câini, vulpi.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ŞI DOZA PRESCRISĂ

Doză per animal, ml:

- cabaline – 30 - 120 ml,
- bovine – 30 - 150 ml,
- ovine, caprine – 10 - 30 ml,
- porcine – 10 - 30 ml,
- câini – 5 - 10 ml,
- vulpi – 1 – 5 ml

8. PERIOADA DE AŞTEPTARE

0 zile.

9. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos , separat de produse alimentare şi furaje, la T^0C 0C+25^{0}C, în locuri inaccesibile pentru copii şi animale.

10. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul de uz veterinar nefolosit se utilizează în conformitate cu reglamentările locale în vigoare.

Ambalajele deşarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deşeurile menajere.

11. ATENŢIONĂRI SPECIALE

Atenţionări speciale pentru fiecare specie-ţintă:

Nu sunt.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale:

Administrarea intravenoasă, lentă! În prealabil medicamentul se încălzeşte pînă la T^0C corpului animal. A nu se administra sub piele - este posibilă necroză ţesutului subcutanat.

În urma administrării rapide intravenoase – flebite, tromburi.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu Soluţie glucoză 40% e necesar de a respecta regulile comune de igienă personală şi a tehnicii securităţii prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

Persoanelor hipersensibile la componentele medicamentului se recomandă evitarea contactului direct cu Soluţie glucoză 40%.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

În caz de contact accidental a medicamentului cu pielea sau tunicile mucoase oftalmice, ele se spală din abundență cu apă. În caz de apariție a reacției alergice,e important de adresat la o instituție medicală cît de repede posibil (cu sine de avut eticheta sau prospectul).
În timpul lucrului se interzice fumatul,consumul de alimente şi băuturi.
La finisarea lucrului mîinile se spală cu apă şi săpun.

Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Fără particularități deosebite.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Soluția de glucoză este incompatibilă cu hexametilentetramina (oxidează urotropina), cu alcaloizi (duce la scindarea lor), cu anestezice generale (reduce acțiunea lor).
Glucoza considerabil reduce acțiunea preparatelor adrenomimetice, inactivează streptomicina, scade eficienţa nistatinei.
Soluția de glucoză prolonghează acțiunea stupefiantelor, a penicilinei şi adrenalinei.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii.
A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane din sticlă a cîte 50; 100; 200; 250 şi 400 ml.
Flacoane din polimer a cîte 50 și 100 ml.

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI

10/2021

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL" Zoofarmagro", m.Chişinău, str.Cameniţa 4a; tel/fax +373 022 855-071;
Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR