Anexa Nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Rex şi Musea
Spray insectoacaricid

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament de uz veterinar deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
- Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALEPRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service"
str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Şargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina
tel. / fax: (0432) 55-14-28, (0432) 55-14-27

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAŢIA ŞI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Rex şi Musea, spray insectoacaricid

1 ml de medicament conţine:
Substanţa activă:
Fipronil - 3,0 mg.

Excipienţi: alcool izopropilic, glicerină, ulei de ricin, acid citric, apă distilată.

Soluţie pentru uz extern.
Lichid uleios transparent, de culoarea de la galben deschis până la galben, cu miros specific.

3. INDICAŢII TERAPEUTICE *(pe specii ţintă)*

Profilaxia şi tratamentul câinilor şi pisicilor afectate de ectoparaziţi: purici (*Ctenocephalus spp.*), păduchi (*Linognathus setosus*), malofage la etapele de dezvoltare imago şi larvă (*Trichodectidae spp.*), acarienii scabiei şi parazitiformi (*Dermacentor spp., Ixodes spp., Rhipicephalus spp.*), acarieni acariformi (*Sarcoptidae, Psoroptidae*).
Este eficient în tratamentul scabiei a urechii la carnivore – otodectoză (*Otodectes cynotis*).

«FARMAVET» S.A.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

4. CONTRAINDICAŢII

A nu se trata animalele bolnave şi caşectice, animalele în perioada de gestaţie şi alăptare, căţeii şi pisicile cu vârsta de până la 10 săptămâni, câinii cu greutatea corporală de până la 1 kg, precum şi animalele sensibile la componentele medicamentului.

5. REACŢII ADVERSE

Dacă animalul linge zona aplicării, poate fi observată o scurtă perioadă de hipersalivaţie, în principal datorită naturii excipientului.
Printre efectele adverse extrem de rare după folosirea medicamentului, au fost raportate reacţii cutanate trecătoare la locul aplicării cum ar fi eritem, prurit sau alopecie. În mod excepţional, au fost raportate după aplicare hipersalivaţie, simptome neurologice reversibile (agitaţie, depresie, nervozitate), vomă sau simptome respiratorii.

6. SPECII ŢINTĂ

Câini şi pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ŞI DOZA PRESCRISĂ

Pentru uz extern. Înainte de tratarea animalului, flaconul se agita foarte bine şi se pulverizează corpul animalului de la o distanţă de 10-15 cm, medicamentul fiind aplicat pe întreaga suprafaţă, în direcţia opusă creşterii firelor de păr până când se udă toată blana până la piele.
Se calculează consumul de produs - 2-5 ml per 1 kg de greutate corporală a animalului, apăsând supapa de pulverizare - 5 PULVERIZĂRI (0,5 ml). Atunci când pulverizaţi, ţineţi flaconul în poziţie verticală. La animalele cu blană lungă; înainte de folosirea medicamentului se va pieptăna bine si produsul se va aplica, astfel încât acesta să ajungă pe pielea animalului.
În caz de scabie, păduchi, tratamentul se efectuează de 2-3 ori, la intervale de 10-12 zile.
Tratamentul animalelor se efectuează în perioada activităţii sezoniere a paraziţilor, dacă este necesar.
În scopul profilactic pentru prevenirea infectării animalelor cu ectoparaziţii, ar trebui să fie schimbate periodic sau prelucrate aşternutul şi articolele de îngrijire pentru animale, în proporţie de 2 ml de spray pe 1 m^2.
Atunci când se tratează otodectoza (râie auriculară) pavilionul urechii si conductul auditiv se curăţă preventiv de ceară, exudat şi cruste, apoi se pulverizează în fiecare ureche a cîte 0,5 ml de medicament.
Pentru ca medicamentul să fie distribut uniform, uşor se masează pavilionul urechii la bază, iar capul animalului se fixează pentru câteva minute pentru a preveni stropirea medicamentului.
Medicamentul se administrează în ambele urechi, chiar şi în cazul că este afectată doar una.
Căpuşele Ixodida de pe animal se distrug prin aplicarea de 0,5 ml de medicament direct pe căpuşă şi locul de fixare a căpuşei pe piele. În cazul în care în decurs de 30 de minute căpuşa nu cade singură, sa îndepărtează cu grijă cu ajutorul unei pensete şi se distruge.

«FARMAVET» S.A. IDNO 1002600023747

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

8. PERIOADA DE AŞTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

În loc uscat, ferit de lumină, plasat la temperaturi de la +2 pînă la +30 ° C.
A nu se păstra cu alimente, băuturi şi hrana pentru animale.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

10. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.
Medicamentul nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă datorită pericolului pentru peşti şi alte organisme acvatice Nu contaminaţi lacurile cursurile de apă sau canalizarea cu produsul sau cu ambalajul acestuia.

11. ATENŢIONĂRI SPECIALE

Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Nu depăşiţi doza recomandată.
Evitaţi contactul medicamentului cu ochii animalului. Nu aplicaţi spray-ul direct pe pielea lezată.
Tratamentul se efectuează la aer liber sau într-o încăpere bine ventilată, ţinând animalul până la uscarea completă a blănii.
Nu plasaţi animalele în spaţii închise sau cuşti pentru transportul animalelor de companie înainte ca blana să fie complet uscată.
Este important să vă asiguraţi că animalele nu pot să se lingă unul pe celălalt după tratament.
Ţineţi animalele tratate departe de foc sau alte surse de căldură şi de suprafeţele susceptibile să fie afectate de spray-ul alcoolic, timp de cel puţin 30 de minute după aplicarea spray-ului sau până la uscarea completă a blănii.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
A nu se fuma, mânca sau bea pe durata tratamentului.
Acest medicament este iritant pentru ochi şi mucoase. De aceea, contactul acestui medicament cu ochii sau gura trebuie evitat. În caz de contact accidental cu pielea sau ochii, se va clăti imediat şi abundent zona cu apă, în caz de ingestie accidentală, trebuie imediat de contactat medicul.
După finisarea tratamentului se spală mâinile cu apă şi săpun.
Animalele tratate nu trebuie scăldate, manipulate şi nu trebuie să fie permis contactul cu copii timp de 48 ore după prelucrare. De aceea, se recomandă ca animalele să nu fie tratate în timpul zilei, ci seara, iar animalelor recent tratate nu trebuie să li se permită să doarmă cu proprietarii acestora şi, în special cu copii.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:
A nu se tratata animalele în perioada de gestație și alăptare.
Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:
Nu se cunosc.
Supradozare:
Riscul efectelor adverse poate crește la supradozare. În caz de supradozare se va institui un tratament cu sulfat de atropină în doze terapeutice și tratament simptomatic.

12. PERIOADA DE VALABILITATE
Perioada de valabilitate este 2 ani.

13. STATUT LEGAL
Se eliberează fără prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR
Flacoane din sticlă și/sau polimer cu pulverizator a câte 30, 50, 100, 150, 200 ml.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI
11/2021

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

PENTRU DOCUMENTE «FARMAVET» S.A. IDNO 1002600023747