



PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Bisanar^R

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

AO "Agrobioprom", 105064, Rusia, or. Moscova, str. Kazakova 6/1

AO "Agrobioprom", 143985, reg. Moscova, Balașiha, ș. Poltevscoe 4

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Bisanar^R

Soluție omogenă de culoare de la galben pal la galben pronunțat, pentru uz extern.

Într-un ml se conține:

Substanța activă :

Timol - 100 mg

Excipienți:

Ulei esențial de coriandru, de molid și eter monoetic de etilenglicol.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Bisanar^R se indică în tratamentul și profilaxia varoozei la albi.

4. CONTRAINDICAȚII

Se interzice folosirea preparatului mai târziu decât cu 14 zile până la începutul colectării mierii, pentru evitarea conținutului de reziduuri în miere.

5. REACȚII ADVERSE

Reacții adverse și complicații la administrarea medicamentului conform prospectului de utilizare, de regulă, nu sunt observate.

6. SPECII ȚINTĂ

Albi.



7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Bisanar^R se folosește în perioada de primăvară și toamnă, în perioada când este puțin puiet.

Prelucrarea se face în prima jumătate a zilei, la $T^{\circ}\text{C}$ mai mare de 10°C a aerului.

Înainte de aplicare, 1 ml de medicament se diluează în 1 litru (sau 2 ml/2 litri) de apă caldă ($35 - 40^{\circ}\text{C}$) și se amestecă minuțios pînă obținem o emulsie omogenă care se folosește pe parcursul unei zile. Emulsia obținută, cu ajutorul unei seringi se toarnă cîte 10 ml într-un spațiu între rame. Se efectuează două prelucrări cu interval de 7 zile.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Mierea se dă în consum uman nu mai devreme decît peste 14 zile după ultima administrarea medicamentului.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la $T^{\circ}\text{C } 0^{\circ} - \text{C} + 25^{\circ}\text{C}$, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul nefolosit se utilizează în conformitate cu legislația în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Particularitățile acțiunii în caz de administrare pentru prima dată și în caz de anulare a medicamentului nu sunt stabilite.

Trebuie de evitat încălările regimului utilizării a medicamentului, deoarece aceasta poate duce la o scădere a eficienței. În caz dacă prelucrarea planificată a fost omisă, aceasta trebuie efectuată cât mai curând posibil în aceeași doză după aceeași schemă.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu Bisanar^R, e important de respectat regulile comune de igienă personală și tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar. După finisarea lucrului, mâinile se spală cu apă și săpun. În caz de contact accidental a medicamentului cu pielea sau tuncile mucoasele oculare, e necesar de spălat din abundență cu apă. Persoanelor cu hipersensibilitate la componentele medicamentului se recomandă evitarea contactului direct cu aceste. În caz de apariție a reacției alergice sau îngerare e necesar de adresat la o instituție medicală (cu sine de avut instrucțiunea sau eticheta).

Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Se admite prelucrarea atunci când este lipsă sau o cantitate mică de puiet.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Bisanar^R nu se recomandă a fi administrat concomitent cu alte acaricide.





Supradozare:

Nu au fost cazuri înregistrate.

Incompatibilități:

A nu se folosi concomitent cu alte medicamente acaricide.

12. PERIODA DE VALABILITATE

În ambalaj închis al producătorului - 3 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Fiole din sticlă a câte 1,0 și 2,0 ml, ambalate în blistere din polimer.

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI

11.2021

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m. Chișinău, str. Camenița 4

Tel /fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

