

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Bisanar^R

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Într-un ml se conține:

Substanța activă :

Timol - 100 mg

Excipienți:

Ulei esențial de coriandru, de molid și eter monoetic de etilenglicol.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție omogenă de culoare de la galben pal la galben pronunțat, pentru uz extern.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă:

Albini.

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă

Bisanar^R se indică în tratamentul și profilaxia varoozei la albini.

4.3 Contraindicații:

Se interzice folosirea medicamentului mai târziu decât cu 14 zile până la începutul colectării mierii, pentru evitarea conținutului de reziduuri în miere.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu sunt.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare


4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Particularitățile acțiunii în caz de administrare pentru prima dată și în caz de anulare a medicamentului nu sunt stabilite.

Trebuie de evitat încălcările regimului utilizării a medicamentului, deoarece aceasta poate duce la o scădere a eficienței. În caz dacă prelucrarea planificată a fost omisă, aceasta trebuie efectuată cât mai curând posibil în aceeași doză după aceeași schemă.

4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu Bisanar^R, e important de respectat regulile comune de igienă personală și tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar. După finisarea lucrului, mâinile se spală cu apă și săpun. În caz de contact accidental a medicamentului cu pielea sau tuncile mucoasele oculare, e necesar de spălat din abundență cu apă. Persoanelor cu hipersensibilitate la componentele medicamentului se recomandă evitarea contactului direct cu aceste. În caz de apariție a reacției alergice sau ingerare e necesar de adresat la o instituție medicală (cu sine de avut instrucțiunea sau eticheta).





4.6 Reacții adverse:

Reacții adverse și complicații la administrarea medicamentului conform prospectului de utilizare, de regulă, nu sunt observate.

4.7 Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Se admite prelucrarea atunci când este lipsă sau o cantitate mică de puiet.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Bisanar^R nu se recomandă a fi administrat concomitent cu alte acaricide.

4.9 Doza și calea de administrare

4.9.1 Doze:

1 ml de soluție la 1 litru de apă caldă (35-40⁰ C) și apoi câte 10 ml de emulsie la un spațiu dintre rame.

4.9.2 Mod de administrare: :

Bisanar^R se folosește în perioada de primăvară și toamnă, în perioada când în familie este puțin puiet. Prelucrarea se face în prima jumătate a zilei, la T⁰ C mai mare de +10⁰ C a aerului. Înainte de aplicare, 1 ml de medicament se diluează în 1 litru (0,5 ml/1 litru) de apă caldă (35 - 40⁰ C) și se amestecă minuțios până obținem o emulsie omogenă care se folosește pe parcursul unei zile. Emulsia obținută, cu ajutorul unei seringi se toarnă câte 10 ml într-un spațiu între rame. Se efectuează două prelucrări cu interval de 7 zile.

4.10 Supradozare:

Nu au fost cazuri înregistrate.

4.11 Perioada de așteptare:

Mierea se dă în consum uman nu mai devreme decât peste 14 zile după ultima administrare a medicamentului.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice:

5.1.1 Grupa farmacoterapeutică: Ectoparaziticide, insecticide și repeleți.

Cod ATC: QP53AX22

5.1.2 Mecanism de acțiune

Mecanismul său de acțiune nu este pe deplin cunoscut. Acționează direct asupra acarienilor prin inhalare și contact.


5.1.3 Efecte farmacodinamice

Timolul posedă acțiune acaricidă împotriva varoozei la albine melifere, la fel are proprietăți: bactericidă, fungicidă și dezinfectantă.

5.1.4 Eficacitate și siguranță clinică

Utilizarea Bisanar^R nu induce apariția populației de acarieni rezistente.

Nu este toxic pentru albiși, în doze recomandate nu acționează negativ asupra vitalității și productivității a familiilor de albiși.





5.2 Proprietăți farmacocinetice

După gradul de impact asupra organismului, face parte din substanțele puțin toxice (clasa 4 conform GOST 12.1.007-76), la administrare în doze recomandate nu posedă acțiune resorbtivă, local-iritantă sau sensibilizantă.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:

Ulei esențial de coriandru, de molid și eter monoetic de etilenglicol.

6.2 Incompatibilități:

A nu se folosi concomitent cu alte medicamente acaricide.

6.3 Perioada de valabilitate:

În ambalaj închis al producătorului - 3 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului indicat pe ambalaj.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

A se păstra în ambalaj închis al producătorului, la loc uscat, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la $T^{\circ}C$ $0^{\circ}C$ - $+25^{\circ}C$, în locuri inaccesibile copiilor.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Fiole din sticlă a câte 1,0 și 2,0 ml, ambalate în blistere din polimer.

6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Medicamentul nefolosit se utilizează conform legislației în vigoare, ambalajele deșarte se utilizează cu deșeurile menajere.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

AO "Agrobioprom", 105064, Rusia, or. Moscova, str. Kazakova 6/1

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

210114

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

25.11.2021

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

11.2021

