Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Albendazol 10% suspensie

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament de uz veterinar deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane, care îl pot utiliza greşit.

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service"
str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Şargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina
tel. / fax: (0432) 55-14-28, (0432) 55-14-27

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Albendazol 10% suspensie

1 ml de medicament conţine (mg):
Substanţa activă:
Albendazol – 100 mg;

Lista excipienţilor:
Tiloză, polisorbitol-80, apă purificată.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Deparazitarea bovinelor, ovinelor şi caprinelor de nematode gastrointestinale şi pulmonare, cestodoze şi trematode:
Bovine, ovine, caprine:
- nematode pulmonare şi gastrointestinale - haemonhuses (Haemonchus placei, H. contortus), nematode (Nematodirus filicollis, N. spathiger), habertioză (Chabertia ovina), bunostomoză (Bunostomum trigonocephalum, B.phlebotom vengo),
(Oesophagostomum columbianum, O. radiatum, O. venulosum), trichuroza (Trichuris ovis, T. skrjabini), strongiloidoză (Strongyloides papillosus), dictiocauloză (Dictyocaulus filaria, D. viviparus).
- cestodoze – moniesioz (Moniezia expansa, M. benedeni), tizaniezios (Thysaniezia giardi)
- trematode - fasciolioză (Fasciola hepatica), dicrocelioză (Dicrocoelium dendriticum).

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

4. CONTRAINDICAŢII

A nu se administra animalelor bolnave şi subnutrite, bolnave de boli infecţioase.

5. REACŢII ADVERSE

La animalele sensibile la benzimidazol, sunt posibile complicaţii: reacţii alergice (erupţii cutanate, mâncărime, edeme), afectarea circulaţiei sângelui.

6. SPECII ŢINTĂ

Bovine, ovine şi caprine.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ŞI DOZA PRESCRISĂ

Medicamentul este administrat animalelor numai individual, oral, în următoarele doze:

Specia de animal	***Tipul de helminţi***	***Cantitatea de preparat medicamentos ml/10 kg masa vie***	***Metoda de administrare***
Bovine	Nematode, cestode	0,75	O singură administrare, în trichuroză - de două ori, cu interval de 24 de ore.
	Trematode (fasciolioză cronică)	1	
Ovine, caprine	Nematode, cestode	0,5	O singură administrare
	Trematode (fasciolioză cronică) Dicroceliază cronică	0,75	
	Dicroceliază cronică	1,5	

O dietă specială şi laxative nu se va utiliza înainte de deparazitare. Agitaţi bine flaconul cu medicamentul înainte de utilizare.

Pentru rumegătoare, medicamentul este administrat folosind un seringă-dozator.

Înainte de tratamentele în masă, fiecare lot de medicament este testat preliminar pe un număr mic dintr-un grup de animale (5-7 capete) cu diferită masă corporal în dozele recomandate. Dacă nu au fost observate semne de complicaţii la animale în decurs de două zile, atunci medicamentul este utilizat pentru întregul şeptel.

Deparazitarea preventivă se efectuează înainte de programul de vaccinare şi animalele nou sosite; la animale la 1,5 luni după intrarea în păşune şi la fiecare 1,5 luni; bovine adulte în toamnă înainte de a fi transferate în grajduri.

Dacă este necesar, terapia pentru fasciolioză la rumegătoare, medicamentul este utilizat în orice moment al anului. Având în vedere că albendazolul este ineficient împotriva formelor tinere de fasciole, prima deparazitare preventivă se efectuează la 2-2,5 luni după sfârşitul perioadei de păşunat şi a doua - cel târziu cu 10-15 zile înainte de a ieşi la păşune.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimente
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu,
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

8. PERIOADA DE AŞTEPTARE

După ultima utilizare a medicamentului, este permisă sacrificarea animalelor pentru carne: bovine, ovine, caprine - după 14 zile.
Laptele poate fi consumat după 4 zile după ultima utilizare a medicamentului.
În cazul sacrificării forţate a animalelor, carnea poate fi folosită ca hrană pentru animale de blană, iar laptele poate fi utilizat pentru consumul la animalele neproductive.

9. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc uscat, întunecat, inaccesibil copiilor, la temperaturi de la +5° C pînă la +25° C.

10. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

11. ATENŢIONĂRI SPECIALE

Atenţionări speciale pentru fiecare specie-ţintă:
Nu utilizaţi în fascioliază acută!
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Trebuie de evitat încălcările regimului utilizării a medicamentului, deoarece aceasta poate duce la o scădere a eficienţei. În caz dacă tratamentul planificat a fost omis, acesta trebuie efectuat cât mai curând posibil în aceeaşi doză după aceeaşi schemă.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
Când lucraţi cu medicamentul, este necesar să respectaţi regulile generale de igienă personală şi măsurile de siguranţă prevăzute atunci când lucraţi cu medicamente de uz veterinar.
Când lucraţi cu medicamentul, este interzis să fumaţi, să beţi, să mâncaţi.
După manipularea medicamentului, spălaţi-vă bine mâinile cu apă şi săpun.
Utilizare în perioada de gestaţie şi lactaţie:
A nu se utiliza la animale în prima treime a gestaţiei, în timpul împerecherii.
Interacţiuni cu alte medicamente de uz veterinar şi alte forme de interacţiune:
Nu utilizaţi simultan cu alte medicamente antiparazitare!
Supradozare
Când se utilizează medicamentul în dozele recomandate, nu se observă semne clinice de supradozare. Limita de siguranţă depăşeşte doza terapeutică de 5 ori. În caz de supradozare semnificative, este necesară spălarea stomacului, urmată de utilizarea cărbunelui activat şi antiemetice. Simptome de supradozare: vomă, somnolenţă, ficatul mărit, colorare roşie maronie a urinei, salivei, lacrimilor şi fecalelor.

«FARMAVET» S.A.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar aşa cum este ambalat pentru comercializare: 36 luni.

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripţiei veterinare.

14. NATURA ŞI COMPOZIŢIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane din polimer de 10, 50, 100 ml, canistre de 1 litru şi 5 litri.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

11/2021

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

REPUBLICA MOLDOVA mun. CHIŞINĂU, SOCIETATEA PE ACŢIUNI
PENTRU DOCUMENTE
«FARMAVET»
S.A.
IDNO 1002600022161