



PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Vanguard^R Plus 5/CVL

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

Deținător:

Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
Belgia

Producător:

Zoetis Inc.
Kalamazoo,
MI49001
United States

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Vanguard^R Plus 5/CV-L

Vaccin viu atenuat, pentru câini, împotriva bolii Carre, infecției provocate de adenovirusul de tip 2, parainfluenței, enteritei cauzate de parvovirus, contra infecțiilor cauzate de *Leptospira canicola* și *Leptospira icterohaemorrhagiae* și vaccin viu atenuat contra coronavirozei.

Conține două fracții: liofilizată și lichidă.

Fracția liofilizată se prezintă ca o masă poroasă, ușoară, de culoare de la alb, la crem sau galben-pal, cea lichidă este opacă de culoare roz-pal.





Compoziția calitativă și cantitativă

Fiecare doză (1 ml) de Vanguard Plus 5/CV- L conține :

Substanța activă:

Fracția liofilizată: Component – PC 4637.23

Virusul bolii Carre,

Tulpina N-CDV(virus viu atenuat) $\geq 10^{3.5} \text{TCID}_{50}$

Adenovirus canin tip 2,

Tulpina Manhattan (virus viu atenuat) $\geq 10^{3.4} \text{TCID}_{50}$

Virusul parainfluenței canine,

Tulpina NL-CPI-5(virus viu atenuat) $\geq 10^{5.5} \text{TCID}_{50}$

Parvovirus canin atenuat

Tulpina NL-35-D,(virus viu atenuat) $\geq 10^{7.2} \text{TCID}_{50}$.

Leptospira canicola inactivă,

Tulpina C-51 $\geq 600 \text{NU}$

Leptospira icterohaemorrhagiae,

Tulpina NADL (11403), $\geq 600 \text{NU}$

Fracția lichidă: FirstDose CV

Virusul Coronavirozei canine,

Tulpina NL -18 (atenuat) $\geq 2,50 \text{PR}$

Excipienți:

Hidroxid de aluminiu

Gentamicina

Mertiolat

Soluție stabilizatoare de hidrolizat de cazeină

Soluție stabilizatoare de gelatină

Stabilizator de zaharoză

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Vanguard^R Plus 5/CVL se indică pentru imunizarea activă a câinilor contra bolii Carre (jigodiei), hepatitei, parainfluenței, coronavirozei, parvovirozei, leptospirozei cauzate de *Leptospira canicola* și *Leptospira icterohaemorrhagiae* de la vârsta de 6 săptămâni.

Instalarea imunității se realizează peste aproximativ 2 săptămâni după ultima vaccinare. Durata imunității este de 12 luni de la ultima doză.

4. CONTRAINDICAȚII

Animale în perioada de incubație a unei boli infecțioase, malnutriție, invaziile parazitare, perioada de gestație și lactație.



5. REACȚII ADVERSE

Cățeii vaccinați pot avea o umflătură tranzitorie după 4-6 ore de la vaccinare care se va resorbi peste aproximativ 7 zile, ocazional pot apărea reacții de hipersensibilitate.

În rare cazuri se poate manifesta reacție anafilactică, în astfel de cazuri se administrează adrenalină sau un alt medicament echivalent.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini de la vârstă de 6 săptămâni.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Se reconstituie aseptice un flacon cu liofilizat cu flaconul de component lichid, se agită și se injectează imediat întreg conținutului (1 ml) subcutanat sau intramuscular.

Vaccinarea primară:

La căței cu vârsta de 6 săptămâni: 3 doze cu interval de 21 zile, adică la 6-9-12 săptămâni.

Dacă vaccinarea începe mai târziu de 8 săptămâni se administrează două doze la interval de 14-21 zile.

Revaccinare:

O singură doză de Vanguard^R Plus 5/CVL anual.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la T°C +2 - +7°C, a nu se permite congelarea, a se feri de lumină.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Vaccinul nefolosit timp de 30 minute după reconstituire, cel congelat, cu termenul de valabilitate expirat sau cu semne necorespunzătoare medicamentului dat, se inactivează prin fierbere timp de 15 minute.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Este recomandată vaccinarea câinilor sănătoși.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Pentru administrarea vaccinului se vor folosi ace și seringi sterile. Nu se folosește seringi sau ace sterilizate chimic (pentru evitarea interferenței asupra eficacității vaccinului). Nu se va steriliza locul administrării cu substanțe chimice deoarece urmele rămase pot inactiva vaccinul. Datorită patogenității reduse a tulpinilor prezente în vaccin, nu este necesar ca animalele vaccinate să fie ținute separat de cele nevaccinate.



Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu vaccinul Vanguard Plus 5/CVL, e important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității în lucru cu medicamente de uz veterinar.

A se evita contactul direct cu pielea sau tunicile mucoase și în caz de contact accidental, ele se spală din abundență cu apă. În timpul lucrului a nu se fuma, consuma băuturi sau alimente.

La finisarea lucrului mâinile se spală cu apă și săpun.

În caz de autoinjectare, dacă apar simptome, solicitați sfatul medicului și prezentați prospectul sau eticheta vaccinului.

Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu se administrează animalelor gestante și în lactație.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se recomandă administrarea altui vaccin timp de 14 zile până la sau după vaccinarea cu Vanguard Plus 5/CV-L.

Supradozare

Nu au fost cazuri înregistrate.

Incompatibilități:

A nu se combina cu oricare alt vaccin sau medicament imunologic.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Fracția liofilizată - 18 luni, cea lichidă - 18 luni din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului indicat pe ambalaj.

Se va folosi întregul conținut imediat după reconstituire.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Fracția lichidă și cea liofilizată sunt ambalate la fel în flacoane din sticlă cu dop din cauciuc și capac din aluminu securizat.

Cutii cu componenta liofilizată conținând 1, 10, 25 și 100 flacoane x 1 ml și componenta lichidă conținând 1, 10, 25 și 100 flacoane x 1 ml.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI

12.2021

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL Zoofarmagro m. Chișinău, str. Camenița 4a

Telefax +373 022 855-071; Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru



NUMAI PENTRU UZ VETERINAR