



## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

### Cistotel zoospray

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

### 1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Numele și adresa: SA Firma științifico-productivă "Ecoprom", Rusia  
regiunea Moscova, Lyubertsy, R. P. Tomilino, Garshina str., 11/23, sediu 263  
Telefon: +7 903 104 59 75; e-mail: litvinenko@ekoprom.org  
www.ekoprom.org

### 2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Cistotel Zoospray

#### Substanța activă:

Permetrin - 0,35%

#### Excipienți:

PEG-40, glicerină și alcool izopropilic.

Soluție pentru uz extern.

Soluție transparentă, incoloră sau de culoare slab gălbuie.

### 3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Cistotel zoospray este utilizat pentru nimicirea căpușelor Sarcoptes și Ixodida, puricilor, paduchilor, care parazitează pe câini, pisici și iepuri decorativi, precum și pentru a preveni atacul de ectoparaziți pe animale.





#### 4. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate cunoscută la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

Nu se utilizează animalelor bolnave de maladii infecțioase și convalescente.

Nu este permisă utilizarea în caz de perforarea membranei timpanice.

Nu se utilizează la cățeluși, pisoiași și iepurași cu vârsta mai mică de 10 săptămâni.

#### 5. REACȚII ADVERSE

Efecte secundare și complicații la utilizarea Cistotel zoospray în conformitate cu prospectul de utilizare, de regulă, nu sunt observate.

În caz de sensibilitate individuală crescută a animalului la componentele medicamentului, pot apărea reacții individuale (hipersalivație, lacrimare, tremor muscular, semne de iritare a pielii). În acest caz tratamentul este oprit, animalul bine se spală cu apă și șampon, și dacă este necesar, se efectuează terapie de desensibilizare.

#### 6. SPECII ȚINTĂ

Pisici, câini și iepuri decorativi.

#### 7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Tratamentul animalelor se efectuează la aer curat sau într-o încăpere bine aerisită cu ferestrele deschise, ferit de foc, preventiv se scot din încăpere coliviile cu păsări decorative și se acoperă acvariu cu pești.

Pentru a se evita ca animalul să se lingă, se fixează pe gât un guler de protecție, botniță sau maxilarii se închid cu panglică într-o buclă, care se scot peste 20-30 minute după aplicare.

Înainte de utilizare, flaconul cu medicamentul este agitat, ținându-l vertical, se apasă pistonul de pulverizare, direcționând jetul de aerosol pe suprafața tratată de la o distanță de 15-20 cm.

Doza de medicament, în funcție de greutatea și starea blăni, este de 3 - 6 ml pentru pisică și câine, pentru iepurii decorativi doza de medicament, în funcție de afectare, este de 0,2 - 1,0 ml pe animal. O apasare pe pistonul de pulverizare a flaconului de 100 ml asigură o doză de 0,1 ml.

Se pulverizează pe tot corpul animalului, se aplică în direcția opusă creșterii firelor de păr până când se udă toată blana până la piele. La animalele cu părul lung se ciufulește blana astfel încât medicamentul să ajungă până la nivelul pielii animalului. Acoperind ochii animalului, se pulverizează pavilionul urechii și zona toracală. Pentru zona capului și a ochilor, se pulverizează pe o mânășă și se aplică cu atenție pe blană.

Tratamentele repetate se efectuează conform indicațiilor, dar nu mai des decât o dată în 10 zile.

Pentru nimicirea căpușelor Ixodida pe corpul animalului, Cistotel zoospray se aplică pe căpușă și locul de fixare a căpușei pe piele (o apasare pe pistonul de pulverizare). În caz dacă căpușa nu cade peste 20 de minute, atunci se îndepărtează atent cu o pensetă și se nimicește.





Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor  
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63  
INREGISTRAREA DE STAT  
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR  
**APROBAT**

În caz de sarcoptoză și notoedroză Cistotel zoospray se aplică pe suprafețele afectate, preventiv curățate de cruste, și 1 cm de țesut limitrof (de la periferii spre centru). Tratamentul se repetă de 3-5 ori cu interval de 7-10 zile, până la însănătoșirea animalului, ce se adevărește cu două rezultate negative a examenului acarologic de laborator.

Animalele cu suprafețe mari afectate se prelucrează în două etape cu interval de 1 zi, aplicând soluția mai întâi pe o parte a corpului, apoi pe cealaltă parte afectată a corpului.

Se recomandă ca tratamentul să se efectueze în complex cu medicamente patogenetice și simptomatice.

În caz de otodectoză, psoroptoză la iepuri canalul urechii externe se curăță de cruste, apoi se pulverizează partea internă a pavilionului urechii a câte 1-2 apăsări pe pistonul de pulverizare (în dependență de mărimea animalului), aplicând 0,1-0,2 ml de medicament. Apoi ușor se masează pavilionul urechii la bază. Tratamentul se repetă de 2-3 ori cu interval de 5-7 zile. Este necesar ca soluția să fie aplicată în ambele urechi, chiar și în cazurile când este afectată o singură ureche.

În cazul complicațiilor de otită se prescriu antimicrobiene și antiinflamatoare.

Este important să vă asigurați că după tratament animalele nu se pot linge, nu au acces la foc și dispozitive de încălzire, până la uscarea completă a blănii

În scopul de a nimici ectoparaziții în încăpere și de a preveni infectarea repetată a animalelor, cuștile și așternuturile se pulverizează cu Cistotel zoospray a câte 2 ml la 1 m<sup>2</sup> de suprafață prelucrată.

Timp de 3 zile animalului nu se permite contactul cu obiectele prelucrate, iar pentru utilizarea lor ulterioară se spală cu detergenți.

## 8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

## 9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul original închis, la loc uscat, protejat de acțiunea directă a razelor solare, separat de alimente și furaje, departe de foc și dispozitive de încălzire, la temperaturi de la 0°C până la 30°C. A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

## 10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul neutilizat este eliminat în conformitate cu cerințele legislației. Este interzisă utilizarea ambalajelor goale de sub medicament în scopuri casnice, este supusă eliminării cu deșeurile menajere.

## 11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

**Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:**

Nu este destinat utilizării la animale productive.





### **Precauții speciale pentru utilizare la animale:**

Particularitățile acțiunii în caz de administrare pentru prima dată și în caz de anulare a medicamentului nu sunt stabilite.

Trebuie de evitat încălcările regimului utilizării a medicamentului, deoarece aceasta poate duce la o scădere a eficienței. În caz dacă prelucrarea animalului planificată a fost omisă, aceasta trebuie efectuată cât mai curând posibil în aceeași doză după aceeași schemă.

### **Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:**

În timpul manipulării Cistotel zoospray, trebuie să respectați regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță, prevăzute în timpul lucrului cu medicamente.

Nu fumați și consumați alimente sau băuturi în timpul aplicării.

La finisarea lucrului, mâinile trebuie spălate cu apă caldă și săpun.

Animalele tratate nu trebuie scăldate, manipulate și nu trebuie să fie permis contactul cu copii timp de 2-3 zile după prelucrare.

În caz de contact accidental cu pielea sau ochii clătiți imediat cu apă în abundență.

Persoanele cu hipersensibilitate la componentele medicamentului trebuie să evite contactul direct cu Cistotel zoospray.

În caz de reacție alergică sau în caz de ingestie accidentală, trebuie imediat de contactat o instituție medicală (să prezentați prospectul de utilizare a medicamentului sau eticheta).

### **Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:**

Nu se supun tratamentului femelele gestante și aflate în lactație.

### **Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:**

Nu utilizați simultan cu alte medicamente insectoacaricide.

### **Supradozare**

În caz de supradozare la animale pot fi observate salivare abundentă, tremor muscular, vomă.

În acest caz animalul bine se spală cu apă, și la necesitate se indică terapia simptomatică.

## **12. PERIOADA DE VALABILITATE**

Termenul de valabilitate este de 3 ani de la data producerii.

Este interzisă utilizarea Cistotel zoospray după data de expirare.

## **13. STATUT LEGAL**

Se eliberează fără prescripție veterinară.

## **14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Flacoane de polimer prevăzute cu o pompă mecanică x 100 ml, 200 ml

## **15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI**

12.2021

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

