

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Bars^R zgardă insectoacaricidă (Collar insectoacaricidae Bars).

Denumirea internațională nepatentată a substanțelor active: fipronil, diflubenzuron.

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Substanțe active:

Fipronil - 4%,

Diflubenzuron - 0,1%

Excipienți:

Pentru lista completă a excipienților, vezi secțiunea 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Bandă din polimer de culoare de la cafeniu-deschis la brun, cu fixator.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă:

Câini, pisici.

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă:

Bars^R zgardă insectoacaricidă se aplică câinilor și pisicilor pentru tratamentul și profilaxia arahnentomozelor provocate de purici, păduchi malofagi și hematofagi, căpușe Ixodida.

4.3 Contraindicații:

Sensibilitatea individuală sporită la componentele zgărzii.

Nu se aplică animalelor bolnave și în convalescență, de vîrsta sub 2 luni, în perioada de gestație (ultima treime a gestației) și lactație.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

A nu se folosi animalelor productive.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Se recomandă aplicarea a Bars^R zgardă insectoacaricidă în prealabil contactului presupus cu paraziți.

Bars^R zgardă insectoacaricidă se poartă toată perioada activă a paraziților; încălcarea regimului de folosire duce la diminuarea efectului antiparazitar.

Particularitățile acțiunii la începutul purtării zgărzii și în caz de scoatere a zgărzii nu sunt stabilite.



4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu Bars^R zgardă insectoacaricidă e necesar de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

În timpul lucrului se interzice fumatul și consumul de alimente și băuturi.

La finisarea lucrului, mâinile se spală cu apă și săpun.

Persoanelor cu hipersensibilitate se recomandă evitarea contactului direct cu Bars^R zgardă insectoacaricidă. În caz de contact cu pielea sau tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundență cu apă. În caz de apariție reacției alergice sau ingerare accidentală a se adresa imediat la o instituție medicală (la sine de avut prospectul de utilizare sau eticheta).

Animalelor care poartă această zgardă nu trebuie să fie permis contactul cu copii.

4.6 Racții adverse

La aplicarea zgărzii conform prospectului de utilizare, reacții adverse și complicații nu apar.

În rare cazuri, la animale hipersensibile la componentele zgărzii sunt posibile reacții de hipersalivație, lăcrimare, tremor muscular, vomă, iritare a pielii). În astfel de cazuri folosirea zgărzii se stopează.

4.7 Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Nu se folosește la femele în perioada de gestație (ultima treime a gestației) și lactație.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se recomandă a fi folosite concomitent cu alte insectoacaricide.

4.9 Doza și calea de administrare

După deschiderea ambalajului, zgardă se aplică în jurul gâtului animalului, adaptînd circumferința în așa mod ca între gâtul animalului și zgardă să fie 1,0 - 1,5 cm, capătul liber se trece prin cataramă și surplusul se taie.

Folosirea continuă a Bars^R zgardă insectoacaricidă protejează animalul de insecte și căpușe ixode pe parcursul a 4 luni. La expirarea termenului indicat, zgarda se înlocuiește cu una nouă.

În primele zile după aplicare, este posibil atacul și agățarea căpușelor Ixodida dar peste 1-2 zile, ele cad de la sine.

În cazul gradului înalt de infestare cu insecte, animalul se recomandă a fi scăldat cu șampon insecticid iar așternutul se prelucrează cu soluții insecticide.

4.10 Supradozare:

Nu sunt cazuri înregistrate.

4.11 Perioada de așteptare:

Nu este cazul.



5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice:

5.1.1 Grupa farmacoterapeutică: Insectoacaricide combinate.

Codul ATC: QP53AX65

5.1.2 Mecanism de acțiune:

Mecanismul de acțiune a fipronilului constă în blocarea receptorilor GABA (acidul gamma-aminobutiric) sensibili a ectoparaziților, blocând astfel transferul ionilor de clor prin membrana celulară. Dereglarea fluxului ionilor de clor întrerupe transmiterea impulsul nervos și induce paralizia și moartea parazitului.

Diflubenzuronul inhibă procesul de sinteză a chitinei dereglând năpârlirea a larvelor paraziților, împiedică trecerea lor în stadiile mature, ceea ce duce la micșorarea populației de ectoparaziți.

5.1.3 Efecte farmacodinamice:

Substanțele active din compoziția zgărzii posedă o accentuată acțiune față de formele mature și imature a puricilor, păduchilor malofagi și hematofagi, a căpușelor ixode care parazitează pe câini și pisici. Treptat eliminându-se de pe suprafața benzii se transferă pe suprafața pielii și a blănii, acumulându-se în epiderm, foliculii piloși și glandele sebacee, și oferă o îndelungată acțiune insectoacaricidă și protecția animalelor de ectoparaziți.

5.1.4 Eficacitate și siguranță clinică:

Se recomandă respectarea termenilor recomandați a administrărilor pentru a nu diminua eficiența terapeutică.

Bars^R zgardă insectoacaricidă, după gradul de impact asupra organismului face parte din substanțele relativ toxice (clasa 3 conform GOST 12.1.007-76), este bine tolerată de câini și pisici.

Este toxic pentru iepuri, albi, pești și alți hidrobionți.

5.2 Proprietăți farmacocinetice:

Fipronilul și diflubenzuronul nu se absorb prin piele, treptat se răspîndesc pe suprafața corpului animalului, se acumulează în epidermă, foliculii piloși, glandele sebacee și oferă acțiune insectoacaricidă de contact de lungă durată.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:

Polivinilclorid – 63,9%, dioctilftalat – 25,6%, stearat de calciu – 0,96%, stearat de zinc – 0,32%, ulei de soia epoxidat – 1,9%, cretă fină – 3,2% și colorant – 0,02%.





6.2 Incompatibilități:

Nu se folosește în asociere cu alte insectoacaricide.

6.3 Perioada de valabilitate:

Cu respectarea condițiilor de păstrare, în ambalaj închis - 2 ani

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la T°C de la 0 până la +25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar:

Pachet din peliculă PVC x 1 zgardă, plasat în cutii din carton.

Bars^R zgardă insectoacaricidă se produce în trei mărimi diferite: cu lungimea de 80 cm (pentru câini de talie mare), de 50 cm (pentru câini de talie medie) și de 35 cm (pentru câini de talie mică și pisici).

6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Zgarda nefolosită se utilizează conform legislației în vigoare, ambalajele se utilizează cu deșeurile menajere.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

OOO,, AVZ S-P", 141300, Federația Rusă, reg. Moscova, or. Serghiev Posad, str. Tsentralnaia 1

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

210134

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

10.12.2021

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

12.2021

