



PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

ALBENDAZOL 30

Comprimate

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Numele și adresa: „Medicamentum” SRL, R. Moldova, r. Anenii Noi,
s. Merenii Noi
telefon/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39
e-mail: contact@medicamentum.md

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

ALBENDAZOL 30, comprimate

Substanțele active:

Albendazol – 30 mg

Lista excipienților:

Amidon de porumb – 11 mg

Stearat de magneziu – 4,4 mg

Lactoză – 54,6 mg

3. INDICAȚII TERAPEUTICE (pe specii țintă)

Indicat în dehelmintizarea: câini, pisici.

Câini: *Toxocara canis*, *Ancylostoma spp.*, *Uncinaria spp.*, *Trichocephalus vulpis*.

Pisici: *Paragonimus spp.*



4. CONTRAINDICAȚII

Medicamentul nu se va utiliza în caz de hipersensibilitate la substanța activă și femelelor aflate în prima perioadă de gestație.

5. REACȚII ADVERSE

Nu s-au semnalat.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Câini, pisici:

1 compimat/ 3 kg greutate corporală pe zi (30 mg albendazol) în cestodoze și nematodoze, 2-3 zile.

1 comprimate/ 3 kg greutate corporală pe zi (30 mg albendazol), în Tricocefaloză, timp de 3 zile.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemîna copiilor.

A se păstra în loc uscat, la temperatura 18 - 25°C, ferit de lumină.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe ambalaj.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente, trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE (interdicții)

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Trebuie luate anumite măsuri de precauție pentru evitarea practicilor următoare, care pot antrena un risc mărit de dezvoltare a rezistenței, ducând la ineficiența tratamentului:

Folosirea frecventă și repetată a antihelminticelor din aceeași clasă pe o durată de timp prelungită;

Subdozajul, care poate fi datorat unei subestimări a masei corporale, administrării greșite a medicamentului;



Toate cazurile clinice suspecte de rezistență la antihelmintice trebuie să fie cercetate în continuare folosind teste potrivite (ex. Testul numărătoarei ouălor din fecale). Acolo unde testele sugerează în mod clar rezistența la un anumit antihelmintic, se va utiliza un altul, aparținând unei alte clase farmacologice a cărui mod de acțiune este diferit.

Precauții speciale de utilizare la animale:

Nu sunt.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

A se evita contactul cu ochii și pielea.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu se utilizează la femelele speciilor țintă în prima lună de gestație.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se cunosc.

Supradozare: (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz.

Toxicitatea acestui medicament este redusă, fiind tolerate doze de 5 ori mai mari decât dozele terapeutice uzuale. Rareori în cazul supradozării pot să apară stări depresive și anorexie.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate în ambalaj original – 24 luni.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Borcănaș din plastic cu 100 comprimate ambalate în grup în cutie de carton, însoțite de prospectul de utilizare.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

12.2021

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

