Anexa Nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

CLORURĂ DE CALCIU 10%
soluţie injectabilă

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament de uz veterinar deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Numele şi adresa „Medicamentum" SRL, R. Moldova, r. Anenii Noi, s. Merenii Noi
telefon/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39
e-mail: contact@medicamentum.md

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAŢIA ŞI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

CLORURĂ DE CALCIU 10%
soluţie injectabilă

Substanţa(ele) activă(e):
Clorură de calciu – 100 mg
Lista excipienţilor:
Apă purificată până la –1 ml

3. INDICAŢII TERAPEUTICE *(pe specii ţintă)*

Se recomandă în hipocalcemii, osteomalacii, rahitism, paraplegii ante- şi postpartum, tetanii, spasmofilii, febră vituleră, ca hemostatic şi diuretic, în urticarie şi anafilaxie.

4. CONTRAINDICAŢII

Injectarea intravenoasă CLORURĂ DE CALCIU 10% se face lent, întrerupând administrarea dacă apar tremurături sau fibrilaţii ale muşchilor anconaţi sau ale musculaturii trenului posterior.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

5. REACŢII ADVERSE

Injectarea intravenoasă rapidă poate să ducă la tremurături ale muşchilor şi chiar la şoc. CLORURA DE CALCIU 10% sol. inj. injectată perivenos poate să producă abcese sau chiar necroze ale ţesuturilor adiacente.

6. SPECII ŢINTĂ

-Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ŞI DOZA PRESCRISĂ

Soluţia injectabilă CLOURĂ DE CALCIU 10% se injectează intravenos în următoarele doze:

- la animalele mari 200-500 ml pe zi, timp de 2-3 zile;
- la animalele mijlocii 30-80 ml/zi, timp de 1-2 zile;
- la animalele mici 2-20 ml/zi, timp de 1-2 zile.

Soluţia se injectează, în combinaţie cu soluţii de glucoză (5-10%).

8. PERIOADA DE AŞTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemîna copiilor.
A se păstra în loc uscat, la temperatura 15 - 25°C, ferit de lumină.
A nu se utilza după data expirării marcată pe ambalaj.

10. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Nu se cunosc efecte toxice asupra mediului. După golire ambalajele se vor depozita în recipiente de colectare.
Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente, trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

11. ATENŢIONĂRI SPECIALE *(interdicţii)*

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă:
Injectarea intravenoasă se face lent, întrerupînd administrarea, dacă apar tremurături sau fibrilaţii ale musculaturii trenului posterior, în caz de şoc se administrează adrenalină.
Nu se administrează la animalele cu insuficienţă renală.

Precauţii speciale de utilizare la animale:
Medicamentul va fi administrat numai la indicaţiile medicului veterinar. În cazul administrării medicamentul se injectează cu precauţie.

"MEDIAMENTUM" S.R.L. IDNO 1003601002786

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
Forma galenică (soluţie injectabilă) previne ca medicamentul să intre în contact cu utilizatorul său, prin urmare precauţiile normale de manipulare a medicamentului sunt suficiente. Bineînţeles, efectul medicamentului trebuie întotdeauna luat în considerare, de aceea se recomandă utilizarea mănuşilor.

Utilizare in perioada de gestaţie, lactatie sau in perioada de ouat:
Se utilizează în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune:
Trebuie evitată administrarea concomitentă în urma inactivării prin complexare cu: quinolone, tetracicline, a altor bifosfonati sau a preparatelor pe baza de fluor.

Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz:
Supradozarea poate produce hipercalcemie, vomă, somnolenţă, astenie, costipaţie, cefalee.
În caz de supradozare se recomandă lichid din abundenţă pentru a grăbi excreţia calciului şi a preveni formarea calculilor renali.

12. PERIOADA DE VALABILITATE
Perioada de valabiltate în ambalaj original – 24 luni.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar – 10 zile.
A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL
Se eliberează fără prescripţie veterinară.

14. NATURA ŞI COMPOZIŢIA AMBALAJULUI PRIMAR
Flacoane x 100 ml ambalate în grup în cutie de carton, însoţite de prospectul de utilizare.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI
12.2021

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR