



PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

TETRAMAST

unguent

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Numele și adresa „Medicamentum” SRL, R. Moldova, r. Anenii Noi,
s. Merenii Noi

telefon/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39

e-mail: contact@medicamentum.md

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA TETRAMAST, unguent

1,0 g TETRAMAST, unguent conține:

Substanța activă:

- Oxitetraciclină clorhidrat - 50 mg
- Sulfatiazol - 50 mg

Excipienți:

- Vaselină - 900 mg

3. INDICAȚII TERAPEUTICE (pe specii țintă)

Unguentul posedă acțiune antimicrobiană cu spectru larg de acțiune asupra bacteriilor gram – pozitive și gram – negative, în special asupra formelor cocice, pentru: cabaline, bovine, suine, ovine, caprine, câini, pisici.





4. CONTRAINDICAȚII

Medicamentul trebuie să fie administrat cu precauție.

Nu se administrează la animalele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă sau la excipient.

În timpul tratamentului nu se utilizează laptele din partea afectată a ugerului.

5. REACȚII ADVERSE

Nu sunt.

6. SPECII ȚINTĂ

-Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Unguentul se aplică intracisternal!

caprine – 10ml;

ovine – 10 ml;

bovine – 20ml.

Medicamentul se administrează intracisternal și se aplică extern.

În prealabil medicamentul se încălzește la baia de apă la o temperatură +38 - +40°C.

La vacile, oile și caprele lactante se mulge partea afectată a ugerului într-un vas separat.

Cu ajutorul unei seringi de 20 ml luăm unguentul încălzit. Mamelonul se dezinfectează și apoi cu ajutorul seringii se introduce medicamentul în canalul mamelonului. În acest timp mamelonul se masează atent de jos în sus.

În forme fibrinopurulente a mastitei medicamentul se administrează de 2 ori în zi pînă la vindecarea completă.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE (

Lapte 36 ore după finisarea tratamentului.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemîna copiilor.

A se păstra în loc uscat, la temperatura 18 - 20°C, ferit de lumină.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe ambalaj.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Nu se cunosc efecte toxice asupra mediului. După golire ambalajele se vor depozita în recipiente de colectare.



Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente, trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE (interdicții)

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Nu sunt.

Precauții speciale de utilizare la animale:

Nu este cazul.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă trebuie să evite contactul cu medicamentul de uz veterinar.

În cazul ingestiei accidentale se va apela la medic, căruia i se va prezenta prospectul sau eticheta medicamentului.

La aplicarea medicamentului se vor utiliza mănuși de protecție sterile.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Se utilizează în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar.

Testele de laborator la șoareci și șobolani nu au evidențiat efecte teratogene, fetotoxice sau maternotoxice.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se administrează concomitent cu alte medicamente de uz local.

Incompatibilități:

Datorită riscului de apariție a unor incompatibilități, evitați amestecarea cu alte medicamente de uz veterinar.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate în ambalaj original – 24 luni.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar – 90 zile.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Borcănașe 70 g ambalate în cutie de carton, însoțite de prospectul de utilizare.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

12.2021

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

