

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

PRAZEL+

comprimate

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Numele și adresa „Medicamentum” SRL, R. Moldova, r. Anenii Noi,
s. Merenii Noi

telefon/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39

e-mail: contact@medicamentum.md

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

PRAZEL+, comprimate

1 comprimat PRAZEL+ conține:

Substanța activă:

Praziquantel	– 50 mg
Ivermectină	– 2 mg
Levamisol clorhidrat	– 38 mg

Excipienți:

Amidon de porumb	– 45 mg
Stearat de calciu	– 26 mg
Lactoză	– 439 mg





3. INDICAȚII TERAPEUTICE (pe specii țintă)

Medicamentul este indicat în tratamentul și profilaxia infestațiilor parazitare externe și interne provocate de purici, păduchi, cestode, trematode: *Ancylostoma caninum*, *Dipylidium caninum*, *Diphyllbothrium latum*, *D. Minus*, *Toxocara canis*, *T. Cati*, *Toxascaris leonina*, *Trichocephalus vulpis* u *T. Nuptia*, *Taenia hydatigena*, *T. Multiceps*, *Uncinaria stenocephala*, *Opisthorchis tenuicolis*, *O. viverrini*, *O. sinensis*, *Paragonimus westermani*, *Mesocostoides linattus*, *M. litteratus*, *M. corti*, *M. petrovi*, *Dirofilaria immitis*, *D. renens*, *Echinococcus granulosus* ma *E. Multilocularis* numai forme adulte precum și alți paraziți la câini.

4. CONTRAINDICAȚII

Contraindicații în dozele recomandate nu sunt.

Medicamentul nu se va administra câinilor de rasa Colli, Șelti, Bobtail și cățeilor în vârstă de până la 6 luni.

5. REACȚII ADVERSE

În dozele terapeutice indicate nu sunt.

6. SPECII ȚINTĂ

-Câini.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Medicamentul se administrează la câini pe cale orală în amestec cu o treime din hrană dimineața – 1 comprimat / 10 kg greutate corporală.

Pentru câinii cu vârsta de până la 1,5 ani doza indicată se administrează în 2 reprize cu un interval de 24 ore. În caz de demodecoză medicamentul se va administra repetat peste 10 – 12 zile, paralel efectuându – se terapia simptomatică.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra în loc uscat, la temperatura 18 - 25°C, ferit de lumină.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe ambalaj.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicamentul de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente, trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.



11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Trebuie luate anumite măsuri de precauție pentru evitarea practicilor următoare, care pot antrena un risc mărit de dezvoltare a rezistenței, ducând la ineficiența tratamentului:

Folosirea frecventă și repetată a antihelminticelor din aceeași clasă pe o durată de timp prelungită;

Subdozajul, care poate fi datorat unei subestimări a masei corporale, administrării greșite a medicamentului;

Toate cazurile clinice suspecte de rezistență la antihelmintice trebuie să fie cercetate în continuare folosind teste potrivite (ex. Testul numărătoare ouălor din fecale).

Acolo unde testele sugerează în mod clar rezistența la un anumit antihelmintic, se va utiliza un altul aparținând unei alte clase farmacologice a cărui mod de acțiune este diferit.

Precauții speciale de utilizare la animale:

Nu sunt.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În caz de ingestie accidentală a medicamentului, sau alergii provocate de contactul acestuia cu pielea solicitați imediat sfatul medicului și prezentați eticheta și prospectul medicamentului.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la una dintre componentele medicamentului, trebuie să evite contactul cu acesta

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu se administrează medicamentul femelelor în perioadele de gestație și lactație.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se cunosc.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz:

În caz de supradozare pot apărea efecte secundare manifestate prin: neliniște, nervozitate, aceste fenomene dispar fără tratament, după 2-3 ore.

În cazul intoxicației acute, trebuie inițiată terapia simptomatică și măsurile generale de susținere a animalului.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate în ambalaj original – 36 luni.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.





13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Borcănașe plastic cu 10 comprimate ambalate în grup în cutie de carton, însoțite de prospectul de utilizare.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

12.2021

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

