

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

IVERMECTINĂ 1%
soluție injectabilă

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Numele și adresa „Medicamentum” SRL, R. Moldova, r. Anenii Noi,
s. Merenii Noi

telefon/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39

e-mail: contact@medicamentum.md

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA IVERMECTINĂ 1%, soluție injectabilă

1 ml IVERMECTINĂ 1% soluție injectabilă conține:

Substanța activă:

Ivermectină – 10 mg

Excipienți:

Glicerol – 0,4 ml

Alcool etilic 96% – 0,2 ml

Propilenglicol până la –1 ml



3. INDICAȚII TERAPEUTICE (pe specii țintă)

Se recomandă pentru prevenirea și combaterea endo și ectoparazitozelor la taurine, ovine, caprine și porcine.

Taurine: nematode gastrointestinale și pulmonare: *Ostertagia spp.*, *Haemonchus spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Cooperia spp.*, *Oesophagostomum radiatum*, *Nematodirus spp.*, *Strongyloides papillosus*, *Neoascaris vitulorum*, *Dictyocaulus viviparus*; alți viermi rotunzi: *Parafilaria bovicola* și *Thelazia spp.*; hipodezmoza (*Hypderma spp.*), păduchi, scabie, căpușe.

Ovine și caprine: nematode gastrointestinale: *Haemonchus contortus*; *Ostertagia circumcincta*; *Trichostrongylus axei*; *Nematodirus filicollis*; *Oesophagostomum spp.*; *Chabertia ovina*; *Trichocephalus ovis*; *Strongyloides papillosus*; *Dictyocaulus filaria*; *Protostrongylus spp.*

Porcine: nematode gastrointestinale: *Ascaris suum*, *Hyostrophylus spp.*, *Oesophagostomum spp.*; *Strongyloides spp.*; *Trichocephalus suis*; *Metastrongylus spp.*; *Sarcoptes scabiei* var. *suis*.

4. CONTRAINDICAȚII

Medicamentul nu se v-a injecta intramuscular sau intravenos.

Nu se administrează la femele gestante și în perioada de lactație.

Nu se permite administrarea la alte specii de animale.

5. REACȚII ADVERSE

S-au înregistrat reacții adverse la ivermectină, la animalele care aparțin speciilor țintă, reacții datorate posibilei toxici apărute în urma paraliziei și morții paraziților. Incidența acestor reacții este extrem de scăzută, acestea putând fi evitate dacă tratamentul nu se aplică în perioadele care coincid cu stagiile migratoare în zone geografice în care paraziții sunt endemici.

6. SPECII ȚINTĂ

- Bovine, ovine, caprine, suine.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

În scop profilactic medicamentul se administrează pe cale subcutanată în doze de 1ml/50kg greutate corporală la taurine; la ovine și caprine se recomandă o doză de 0,5ml/25kg de animal viu, la porcine – de 1 ml/33kg greutate corporală.

În scop curativ se efectuează două tratamente la interval de 10 – 14 zile, folosind aceleași doze ca la tratamentul profilactic.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Pentru carne 28 zile de la ultima administrare.

Nu se utilizează la animalele de la care se obține lapte destinat consumului uman.



9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemîna copiilor.

A se păstra la temperatura 15 - 25°C, ferit de lumină.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe ambalaj.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Nu se cunosc efecte toxice asupra mediului. După golire ambalajele se vor depozita în recipiente de colectare.

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente, trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Se vor evita următoarele practici care pot crește riscul dezvoltării rezistenței și pot avea ca rezultat final insuficiența tratamentului:

Utilizarea prea frecventă și folosirea repetată a unor antihelmintice din aceeași clasă, pentru o perioadă lungă de timp.

Subdozarea, care poate fi cauzată de subestimarea greutatei corporale sau de necalibrarea dispozitivelor de dozare.

Cazurile clinice suspecte de rezistență la antihelmintice trebuie investigate în continuare prin metode adecvate (ovocoprosopie, etc). Dacă rezultatele testelor indică clar instalarea rezistenței față de un anumit antihelmintic, se va utiliza un alt antihelmintic din altă clasă farmacologică și care are un mod diferit de acțiune.

Precauții speciale de utilizare la animale:

Medicamentul va fi administrat numai la indicațiile medicului veterinar.

În cazul administrării medicamentul se injectează cu precauție.

Inflamarea țesutului moale poate apărea la locul injectării. De aceea, se recomandă ca medicamentul să se administreze în pliul pielii din față sau din spatele umărului la bovine sau în zona gâtului la ovine, caprine, suine.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la ivermectină trebuie să manipuleze cu atenție medicamentul. Se va evita autoinjectarea: medicamentul poate provoca iritație locală și/sau durere la locul injectării. Evitați contactul cu ochii.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu se administrează la femelele gestante și în perioada de lactație.





În absența unor studii, acest medicament de uz veterinar nu trebuie administrat concomitant cu alte medicamente de uz veterinar.

În general ivermectina are o limită de siguranță de cel puțin 10 ori doza la bovine, ovine, caprine, porcine.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

Se eliberează cu prescripție veterinară.

Flacon din sticlă cu volumul de 10 ml, 50 ml, 100 ml, ambalate individual în cutie de carton, însoțite de prospectul de utilizare.

12.2021

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

