

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

DELTATOX soluție antiparazitară

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
 - Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
 - Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
 - Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.
 - Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră.
- Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Numele și adresa „Medicamentum” SRL, R. Moldova, r. Anenii Noi, s. Merenii Noi
telefon/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39
e-mail: contact@medicamentum.md

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

DELTATOX

Soluție antiparazitară de deltametrin pentru: bovine, ovine, caprine.

1 ml DELTATOX soluție antiparazitară conține:

Substanța activă:

Deltametrin – 50 mg

Excipienți:

Acetat de etil – 100 mg

Polisorbat 80 – 50 mg

Propilenglicol până la – 1 ml

3. INDICAȚII TERAPEUTICE (pe specii țintă)

Medicamentul este recomandat pentru combaterea insectelor zburătoare (familiilor Muscidae și Tabanidae) generatoare de miază (Lucilia sp. Califora sp.), păduchilor malofagi și hematofagi (Bovicola sp. Goniodes sp. Haematofinus sp.), căpușelor (Ixodes sp. Ripicephalus sp.) și a agenților scabiei (Sarcoptes, Notoendres, Cnemidocoptes, Chorioptes, Otodeptes) și a maladiilor provocate de ele.



4. CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează la animalele bolnave sau convalescente.

Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

Nu se supun prelucrării animalele cu vârsta până la 2 luni și cu afecțiuni ale pielii.

5. REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc.

Dacă observați efecte severe sau alte efecte nemenționate în acest prospect, anunțați de urgență medicul veterinar.

6. SPECII ȚINTĂ

- Bovine, ovine, caprine.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Se aplică extern:

Paraziți	Mod de aplicare	Doze (produs/apă)
Bovine, ovine, caprine		
Căpușe	Scufundare	1 ml/2 litri apă
	Pulverizare	1 ml/1 litru apă
	Îmbăiere manuală	1 ml/2 litri apă
Scabie, muște	Pulverizare	1 ml/1 litru apă

Pentru combaterea căpușelor, scabiei (*Sarcoptes* spp.; *Soroptes* spp; *Chorioptes* spp.) ovinele se îmbăiesc peste 6 – 8 zile după tunderea lor. Animalele se prelucrează pe teren special amenajat, dotat cu scurgere.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne și organe: bovine, ovine, caprine – 0 zile.

Lapte: bovine, ovine, caprine – 0 zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra în loc uscat, la temperatura 5 - 25°C, ferit de lumină.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe ambalaj.



10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul nu se deversează în bazinele acvatice, fiind toxic pentru pești.

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente, trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Tineretul sub patru luni se tratează cu multă prudență. După tratament, animalele se feresc de ploaie și acțiunea razelor solare.

Pentru a evita rezistența, medicamentului de uz veterinar trebuie utilizat numai în cazul în care susceptibilitatea populației locale de muște la substanța activă este sigură.

Cazuri de rezistență la deltametrin au fost raportate la muște care înțepă și muște care sunt iritante pentru bovine, păduchi malofagi la ovine.

Medicamentul de uz veterinar va reduce numărul de muște care stau direct pe animal. Utilizarea strategică a medicamentului prin urmare se va baza pe informații epidemiologice locale și regionale cu privire la sensibilitatea paraziților și utilizarea în asociere cu alte metode de gestionare a dăunătorilor.

Trebuie evitate următoarele practici, deoarece acestea cresc riscul de dezvoltare a rezistenței și ar putea conduce în cele din urmă la o terapie inefficientă:

- 1) Utilizarea prea frecventă și repetată de actoparaziticide din aceeași clasă pe o perioadă extinsă de timp;
- 2) Subdozarea, care se poate datora subestimării greutatei corporale, administrării incorecte a medicamentului sau lipsa de calibrare a aparatului de dozare.

Dacă semnele clinice nu sunt soluționate după tratament, diagnosticul trebuie să fie revizuit.

Precauții speciale pentru utilizarea la animale:

Medicamentul de uz veterinar este numai pentru uz extern.

Nu se aplică pe sau în apropierea ochilor animalului și a mucoaselor.

Trebuie evitată lingerea medicamentului. Se va evita utilizarea medicamentului în timpul perioadelor cu vreme extrem de caldă și se va asigura animalelor acces adecvat la apă.

Medicamentul de uz veterinar trebuie administrat numai pe piele intactă. Cu toate acestea pot apărea semne de iritație locală a pielii după tratament deoarece pielea poate fi deja afectată de infestare.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la medicament sau la una din componentele sale trebuie să evite contactul cu medicamentul de uz veterinar. Purtați echipament de protecție, inclusiv șorț și cizme impermeabile, mănuși impermeabile atunci când se aplică medicamentul sau la manipularea animalelor tratate recent. Scoateți hainele puternic contaminate imediat și spălați-le.



A se evita contactul cu pielea. Dacă accidental stropii ajung pe piele, spălați imediat cu apă și săpun din abundență. Spălați-vă mâinile și pielea expusă după manipulare cu medicamentul și înainte de mese. În caz de contact accidental cu ochii, clătiți imediat cu multă apă curată potabilă, și adresați-vă la medic.

A nu se inhala soluția. În caz de ingerare accidentală, spălați imediat gura cu multă apă curată potabilă, și adresați-vă la medic.

Acest medicament conține deltametrin care poate produce furnicări, mâncărime și pete de roșeață pe pielea expusă. Dacă nu vă simțiți bine după ce ați lucrat cu acest medicament, consultați medicul și prezentați acestuia eticheta medicamentului.

Alte măsuri de precauție:

Deltametrinul este foarte toxic pentru fauna din bălegar, organismele acvatice, albinile melifere, este persistent în sol și se poate acumula în sedimente.

Riscul pentru ecosistemele acvatice și fauna din bălegar poate fi redus prin evitarea utilizării prea frecvente și repetate a deltametrinului la bovine și ovine, de exemplu, prin utilizarea unui singur tratament pe an, pe aceeași pășune.

Riscul pentru ecosistemele acvatice va fi redus în continuare prin menținerea animalelor tratate departe de cursurile de apă timp de până la 4 săptămâni de la tratament.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Studii de laborator (șobolani, șoareci) nu au produs nici o dovadă de efecte taratogene sau embriotoxice.

Nu se supun prelucrării animalele în gestație avansată.

Utilizarea medicamentului în timpul perioadei de gestație și lactației la bovine, ovine și caprine trebuie să fie în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medical veterinar responsabil.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Nu se recomandă administrarea concomitentă a insecticidelor organofosforici.

Nu utilizați cu orice alt insecticid sau acaricid.

Supradozare:

Unele reacții adverse au fost observate în caz de supradozare. Acestea includ parestezie și iritații la bovine, precum și urinare intermitentă sau senzații de urinare la miei tineri. Acestea s-au dovedit a fi ușoare, tranzitorii și dispar fără tratament.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate în ambalaj original – 24 luni.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar – 60 zile.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.



14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane 10 ml, 100 ml, 1 litru, produse ambalate în cutie de carton, însoțite de prospectul de utilizare.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

12.2021

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

