

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

DELTATOX

Soluție antiparazitară de deltametrin pentru: bovine, ovine, caprine.

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 ml DELTATOX soluție antiparazitară conține:

Substanța activă:

Deltametrin – 50 mg

Excipienți:

Acetat de etil – 100 mg

Polisorbat 80 – 50 mg

Propilenglicol până la – 1 ml

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție de uz extern.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă:

- bovine, caprine, ovine.

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă:

Medicamentul este recomandat pentru combaterea insectelor zburătoare (familiilor Muscidae și Tabanidae) generatoare de miază (Lucilia sp. Califora sp.), păduchilor malofagi și hematofagi (Bovicola sp. Goniodes sp. Haematofinus sp.), căpușelor (Ixodes sp. Ripicephalus sp.) și a agenților scabiei (Sarcoptes, Notoendres, Cnemidocoptes, Chorioptes, Otodeptes) și a maladiilor provocate de ele.

4.3 Contraindicații:

Nu se administrează la animalele bolnave sau convalescente.

Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

Nu se supun prelucrării animalele cu vârsta până la 2 luni și cu afecțiuni ale pielii.



4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Tineretul sub patru luni se tratează cu multă prudență. După tratament, animalele se feresc de ploaie și acțiunea razelor solare.

Pentru a evita rezistența, medicamentului de uz veterinar trebuie utilizat numai în cazul în care susceptibilitatea populației locale de muște la substanța activă este sigură. Cazuri de rezistență la deltametrin au fost raportate la muște care înțepă și muște care sunt iritante pentru bovine, păduchi malofagi la ovine.

Medicamentul de uz veterinar va reduce numărul de muște care stau direct pe animal. Utilizarea strategică a medicamentului prin urmare se va baza pe informații epidemiologice locale și regionale cu privire la sensibilitatea paraziților și utilizarea în asociere cu alte metode de gestionare a dăunătorilor.

Trebuie evitate următoarele practici, deoarece acestea cresc riscul de dezvoltare a rezistenței și ar putea conduce în cele din urmă la o terapie inefficientă:

- 1) Utilizarea prea frecventă și repetată de actoparaziticide din aceeași clasă pe o perioadă extinsă de timp;
- 2) Subdozarea, care se poate datora subestimării greutatei corporale, administrării incorecte a medicamentului sau lipsa de calibrare a aparatului de dozare.

Dacă semnele clinice nu sunt soluționate după tratament, diagnosticul trebuie să fie revizuit.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

4.5.1 Precauții speciale pentru utilizarea la animale:

Medicamentul de uz veterinar este numai pentru uz extern.

Nu se aplică pe sau în apropierea ochilor animalului și a mucoaselor.

Trebuie evitată lingerea medicamentului. Se va evita utilizarea medicamentului în timpul perioadelor cu vreme extrem de caldă și se va asigura animalelor acces adecvat la apă. Medicamentul de uz veterinar trebuie administrat numai pe piele intactă. Cu toate acestea pot apărea semne de iritație locală a pielii după tratament deoarece pielea poate fi deja afectată de infestare.

4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la medicament sau la una din componentele sale trebuie să evite contactul cu medicamentul de uz veterinar. Purtați echipament de protecție, inclusiv șorț și cizme impermeabile, mănuși impermeabile atunci când se aplică medicamentul sau la manipularea animalelor tratate recent. Scoateți hainele puternic contaminate imediat și spălați-le.

A se evita contactul cu pielea. Dacă accidental stropii ajung pe piele, spălați imediat cu apă și săpun din abundență. Spălați-vă mâinile și pielea expusă după manipulare cu medicamentul și înainte de mese. În caz de contact accidental cu ochii, clătiți imediat cu multă apă curată potabilă, și adresați-vă la medic.



A nu se inhala soluția. În caz de ingerare accidentală, spălați imediat gura cu multă apă curată potabilă, și adresați-vă la medic.

Acest medicament conține deltametrin care poate produce furnicări, mâncărime și pețe de roșeață pe pielea expusă. Dacă nu vă simțiți bine după ce ați lucrat cu acest medicament, consultați medicul și prezentați acestuia eticheta medicamentului.

4.5.3 Alte măsuri de precauție:

Deltametrinul este foarte toxic pentru fauna din bălegar, organismele acvatice, albinile melifere, este persistent în sol și se poate acumula în sedimente.

Riscul pentru ecosistemele acvatice și fauna din bălegar poate fi redus prin evitarea utilizării prea frecvente și repetate a deltametrinului la bovine și ovine, de exemplu, prin utilizarea unui singur tratament pe an, pe aceeași pășune.

Riscul pentru ecosistemele acvatice va fi redus în continuare prin menținerea animalelor tratate departe de cursurile de apă timp de până la 4 săptămâni de la tratament.

4.6 Reacții adverse (frecvența și gravitate).

Nu se cunosc.

Dacă observați efecte severe sau alte efecte nementionate în acest prospect, anunțați de urgență medicul veterinar.

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Studii de laborator (șobolani, șoareci) nu au produs nici o dovadă de efecte taratogene sau embriotoxice.

Nu se supun prelucrării animalele în gestație avansată.

Utilizarea medicamentului în timpul perioadei de gestație și lactației la bovine, ovine și caprine trebuie să fie în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medical veterinar responsabil.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se recomandă administrarea concomitentă a insecticidelor organofosforici.

Nu utilizați cu orice alt insecticid sau acaricid.

4.9 Doză și calea de administrare:

Se aplică extern:

Paraziți	Mod de aplicare	Doze (produs/apă)
Bovine, ovine, caprine		
Căpușe	Scufundare	1 ml/2 litri apă
	Pulverizare	1 ml/1 litru apă
	Îmbăiere manuală	1 ml/2 litri apă
Scabie, muște	Pulverizare	1 ml/1 litru apă



Pentru combaterea căpușelor, scabiei (*Sarcoptes* spp.; *Soroptes* spp; *Chorioptes* spp.) ovinele se îmbăiesc peste 6 – 8 zile după tunderea lor. Animalele se prelucrează pe teren special amenajat, dotat cu scurgere.

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidot), după caz.

Unele reacții adverse au fost observate în caz de supradozare. Acestea includ parestezie și iritații la bovine, precum și urinare intermitentă sau senzații de urinare la miei tineri. Acestea s-au dovedit a fi ușoare, tranzitorii și dispar fără tratament.

4.11 Perioada de așteptare:

Carne și organe: bovine, ovine, caprine – 0 zile.

Lapte: bovine, ovine, caprine – 0 zile.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE.

Remediu antiparazitar extern.

5.1 Proprietăți farmacodinamice.

5.1.1 Grupa farmacoterapeutică: Ectoparaziticid, inclusiv insecticid (piretrine și piretroide).

Codul ATC: QP53AC11

DELTATOX-ul este un insecticid piretroid, având ca substanță activă deltametrinul, cu o eficacitate dovedită în distrugerea sistemului imunitar al insectelor dăunătoare, condiționat sub formă de suspensie concentrată, condiționare ce oferă un raport optim între eficacitatea biologică, remanentă și siguranța în aplicare, atât pentru operator, cât și pentru beneficiar. E biodegradabil, are o fotostabilitate mare, nu pătează, nu lasă urme vizibile după aplicare și nu este inflamabil. Manifestă o eficacitate deosebită împotriva întregului spectru de insecte dăunătoare: Dictyoptera - gândaci, Diptera - muște și țânțari, Siphonoptera - purici, păduchi, Hemiptera - ploșnițe, Lepidoptera - molii, Psocoptera – păduchi. Clasificat în U.E. ca un insecticid cu o toxicitate extrem de scăzută pentru viețuitoarele non-vizate (în special, mamiferele), efectele sale adverse asupra acestora sunt absolut întâmplătoare și neimportante ca gravitate. E insecticid care acționează prin contact și ingestie, penetrând extrem de rapid stratul de chitină al insectelor, paralizându-le sistemul nervos și provocându-le moartea. Aplicarea DELTATOX-ului favorizează formarea unor depozite microscopice de substanță activă după tratament, care nu pot fi absorbite repede de suprafața tratată, generând o remanentă crescută.

5.2 Proprietăți farmacocinetice:

Studiile farmacocinetice a deltametrinului au fost efectuate la șobolani și la șoareci.

Sau administrat pe cale orală deltametrinul cu marca carbonului ^{14}C la șobolani masculi a câte 0,64 - 1,6 mg/kg greutate corporală.



În urma analizei s-a demonstrat că deltametrinul este degradat la un număr mare de metaboliți derivați ai acidul său (6 compuși) și radicali alcoolici (8 compuși) și din derivați din grupa ciano (3 metaboliți).

În termen de 8 zile, 79% din totalul radioactivității (compuși ai deltametrinului cu carbonul ^{14}C) a fost recuperat: 36% în fecale și 43% în urină, inclusiv cu o parte de substanță activă și a derivatului sau hidroxideltametrin.

Principalele mecanisme de metabolizare sunt clivajul în esteri și oxidarea celui de-al patrulea atom de carbon din poziția catenei în alcool, conjugarea în fenoxi-hidroxil și acizi carboxilici, glucuronoconjugare.

Fragmentul de acid este excretat rapid ca glucuronid, cu cantități mici excretate ca moleculă liberă și ca glicină conjugată.

Scindarea grupării ester din deltametrin duce la eliberarea de cianură care este transformată în principal în tiocianat și acidul 2-iminotiazolidin-4-carboxilic.

Femelele de șobolan au primit pe cale intravenoasă 2,4 mg/kg (marcat cu ^{14}C deltametrin).

În 24 de ore, 74,9% din doza administrată este eliminată: 49,17% prin urină și 25,73% prin fecale.

În 120 de ore, 86,6% din doza administrată este eliminată, dintre care 63,28% prin urină.

Numai concentrații scăzute de radioactivitate pot fi măsurate în creier: 96, 9% și 2 $\mu\text{g/kg}$ la 4, 24 și 120 de ore după tratament.

La 24 de ore după injectare, concentrațiile de radioactivitate au fost 34 $\mu\text{g/kg}$ în mușchi, 1665 $\mu\text{g/kg}$ în grăsime, 272 $\mu\text{g/kg}$ în ficat și 211 $\mu\text{g/kg}$ la rinichi.

Iar după 120 ore, s-au depistat următoarele date: 5, 1395, 39 și 29 $\mu\text{g/kg}$ în mușchi, grăsime, ficat și rinichi.

După administrarea orală de 1,7 - 4,4 mg/kg greutate corporală marcată cu ^{14}C deltametrin (în 3 probe diferite), la șoareci masculi, aproape toată radioactivitatea a fost excretată în termen de 8 zile de la administrare. Calea metabolică este similară cu cea descrisă la șobolani, dar procentul relativ de metaboliți găsiți în urină și fecale este puțin diferită.

Deltametrina administrată local rămâne în cea mai mare parte pe stratul de păr al animalelor tratate și este foarte puțin absorbită prin piele. Spre deosebire de piretrine naturale și piretroizi sintetici mai vechi, deltametrina este silențioasă rezistentă la luminile UV, ceea ce permite un efect rezidual între 5 și 10 zile pentru majoritatea spray-urilor și scufundărilor.

Animalele tratate pot ingera deltametrină prin lins și îngrijire. O cantitate mare din acesta este excretată nemodificată prin fecale. Deltametrina absorbită este rapid metabolizată în ficat până la metaboliți netoxici care sunt excretați prin urină. Acest lucru este realizat de o enzimă specifică numită glucuronidază.

Ca regulă generală, medicamentele deltametrinei sunt aprobate pentru utilizare pe animale de lapte în multe țări.



5.3 Proprietăți referitoare la mediul înconjurător:

Deltametrinul are potențial de a afecta negativ organismele nevizate: atât pe cele din, apă cât și pe cele din bălegar. După tratament, excreția deltametrinului poate să-și păstreze nivelul de toxicitate până la 4 săptămâni. Fecalele, care conțin deltametrin, excretate pe pășuni, pot reduce din abundența fauna din bălegar, care poate avea un impact asupra degradării bălegarului.

Deltametrinul este foarte toxic pentru fauna din bălegar, organismele acvatice și albinele melifere. Persistă în sol și se poate acumula în sedimente.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:

Acetat de etil
Polisorbat 80
Propilenglicol

6.2 Incompatibilități:

În absența studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente de uz veterinar.

6.3 Perioada de valabilitate:

Valabilitate 24 luni în ambalaj original.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar – 60 zile.
A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

Medicamentul se depozitează la temperatura 5 - 25°C, ferit de lumină.
A nu se păstra medicamentul și ambalajul la un loc cu hrana. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar:

Flacon de sticlă brună cu volumul de 10 ml.
Flacon de sticlă brună cu volumul de 100 ml.
Flacon de plastic cu volumul de 1 litru.

6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Medicamentul nu se deversează în bazinele acvatice, fiind toxic pentru pești.
Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente, trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.



7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

SRL „Medicamentum”

MD 6527, Republica Moldova, r. Anenii Noi, s. Merenii Noi,

tel/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39.

e-mail: medicamentum@mail.ru

www.medicamentum.md

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

210161

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE *(sau data reînnoirii certificatului de înregistrare)*

24.12.2021

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

12.2021

