Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

ECTOSAN[R]

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acestmedicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

-Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
-Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
-Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
-Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect
-Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO "Brovafarma", Ucraina , or. Brovarî, bul. Nezavisimosti 18a, 07400

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Ectosan[R] – emulsie de uz extern, de culoare galben pal, cu miros plăcut, specific.

1 ml de emulsie conține:
Substanța activă :
Alfa-cipermetrin – 90 mg
Piperonil butoxid – 118 mg

Excipienți:
Alcool etilic – 35,3 mg
Dimetilformamidă – 38,6 mg
Berol – 0,09 mg

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Ectosan [R] în formă de soluţii apoase se foloseşte la bovine, ovine în cazul invaziilor cu ectoparaziţi, sensibili la substanţele active a medicamentului:
Soluţii apoase de Ectosan[R] sunt eficace contra ectoparaziţilor la animale:

- Căpuşi acariforme (familia *Psoroptidae, Sarcoptidae, Demodecidae, Cheyletidae);*
- Căpuşi parazitiforme (familia *Ixodidae, Argasidae, Dermanyssidae);*
- Păduchi (familia *Trichodectidae, Haematopinidae, Holopeuridae, Linognathidae);*
- Insecte hematofage (familia *Muscidae, Calliphoridae, Sarcophagidae);*
- Larvele: de tăuni *(Hipoderma spp.)* estroza ovinelor *(Oestrus ovis);* wolfartioza *(Wohlfahrtia spp.);* muştele *(Sarcophagidae spp.).*

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

4. CONTRAINDICAŢII

Nu se supun prelucrării animalele istovite, bolnave şi femelele gestante în ultimul trimestru.

5. REACŢII ADVERSE

În urma prelucrării, animalele sensibile la substanţele active a medicamentului pot manifesta reacţii adverse ca: excitare şi hipersalivare care repede trec.

6. SPECII ŢINTĂ

Bovine, ovine.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ŞI DOZA PRESCRISĂ

Medicamentul este utilizat pentru a trata animalele prin metoda scăldatului sau pulverizare.
Emulsia de lucru a medicamentului se prepară imediat înainte de utilizare prin adăugarea dozei corespunzătoare de medicament la o anumită cantitate de apă potabilă fără clor.
Soluţiile pentru prelucrarea animalelor se folosesc prin pulverizare cu diferite dispozitive care pot crea dispersie măruntă a lichidului. În cazul afecţiunilor vizibile a pielii (psoroptoză, sarcoptoză ş. a.) soluţia se fricţionează în ele cu ajutorul unei perii, timp de 40-50 sec.
Pentru animale de talie mică (oi) mai eficientă este îmbăierea. Oile se îmbăiesc în locuri special amenajate, după tuns.
Diluţia în raport de 1:750 se utilizează pentru prelucrarea animalelor afectate de căpuşe din familia *Psoroptidae, Sarcoptidae, Dermodecidae*, *Cheyletidae;* insecte din familiile *Haematopinidae, Holopeuridae, Linognathidae*; păduchi din familia *Trichodectidae*.

Pentru o singură prelucrare, soluţiile de lucru sunt utilizate în volum de:
- *bovine* – 1 - 3 litri per animal, iar pentru protecţie împotriva insectelor zburătoare - o dată pe zi în cantitate de 0,2 - 0,3 litri;
- *oi* - 0,5 - 1 litri per animal.

În tratamentul animalelor afectate de căpuşe acariforme, argas, gamazoide si ixodide, tratamentul se repetă după 9-12 zile ân aceeaşi doză.

8. PERIOADA DE AŞTEPTARE

Carne – 14 zile de la ultima prelucrare.
Animalele sacrificate înainte de termenul indicat se utilizează conform legislaţiei naţionale privind subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman.
Lapte – 0 zile.

9. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, în locuri inaccesibile copiilor şi animalelor, separat de produse alimentare şi furaje, la T^{0}C de la 0^{0}C până la +25^{0}C, în ambalaj original de la producător.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

10. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul nefolosit se utilizează conform reglementării locale, ambalajele se utilizează cu deşeurile menajere.

Vasele rămase de la medicament se dezinfectează cu soluţie de 3-5% de sodă calcinată (timp de 5 - 6 ore), după care se spală.
Resturile de medicament se inactivează cu soluţie de 5% de sodă caustică, suspensie de var stins, clorură de var (1:3).
Resturile inactivate se varsă într-o groapă cu adîncime de minim 0,5 m, situată la o distanţă de surse de apă potabilă, rîuri şi păşunile animalelor.

11. ATENŢIONĂRI SPECIALE

Atenţionări speciale pentru fiecare specie-ţintă:
Se recomandă de a respecta dozele prescrise de administrare.
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Nu sunt.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
Toate manipulările cu Ectosan dat se efectuiază folosind hainele de protecţie (halat, mănuşi, cizme, ochelari, mască-respirator).
În timpul lucrului se interzice consumul hranei, băuturilor şi fumatul.
La sfârşirea lucrului mâinile şi faţa se spală cu săpun, gura se clăteşte cu apă.
În caz de contact accidental cu pielea sau tunicile mucoase, soluţia se spală imediat.
În cazul simptomelor de intoxicare (ameţeli, vomă, slăbiciuni) se recurge la ajutorul medicului.
Utilizarea în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat
A nu se prelucra animalele în ultimul trimestru a gestaţiei.
Interacţiuni cu alte medicamente de uz veterinar şi alte forme de interacţiune:
Nu sunt date.
Supradozare
La folosirea Ectosan^{R} conform instrucţiunii date, reacţii de supradozare nu sunt.
În caz de supradozare semnificativă şi apariţie a simptomelor de supradozare, se recomandă tratament simptomatic.
Incompatibilităţi:
În absenţa studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

Toxic pentru peşti şi albini.



Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

12. PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripţie veterinară.

14. NATURA ŞI COMPOZIŢIA AMBALAJULUI PRIMAR

Fiole din sticlă a câte 2; 5; 10 ml; flacoane din sticlă sau polimer a câte 10; 20; 50; 100; 200; 500 şi 1000 ml; canistre din polimer a câte 2,5; 5, şi 10 litri.

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI

02.2022

16. DENUMIREA ŞI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL" Zoofarmagro", m.Chişinău, str.Cameniţa 4a; tel/fax +373 022 855-071;
Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "ZOOFARMAGRO" PENTRU FACTURI ZOO Farm Agro IDNO 1002600041834 REPUBLICA MOLDOVA

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR