

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

IODOSPRAY soluție antiseptică

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Numele și adresa „Medicamentum” SRL, R. Moldova, r. Anenii Noi,
s. Merenii Noi

telefon/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39

e-mail: contact@medicamentum.md

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Substanța activă:

1 ml IODOSPRAY soluție antiseptică conține:

Iod povidonă — 30 mg

Excipienți:

1 ml IODOSPRAY soluție antiseptică conține:

Apă purificată/deionizată până la — 1 ml

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Indicat tuturor speciilor de animale pentru tratamentul local al plăgilor infectate și aseptice, arsuri de gradul I și II, exeme, dermatite, inflamațiile membranelor mucoase ale cavității bucale și faringelui.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu sunt.

Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.



5. REACȚII ADVERSE

În general nu se cunosc.

La animalele sensibile pot apărea reacții alergice (iritații).

Dacă observați efecte severe sau alte efecte nementionate în acest prospect, anunțați medicul veterinar.

6. SPECII ȚINTĂ

- Bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, iepuri, câini.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Medicamentul este administrat extern. Se recomandă de agitat în prealabil flaconul.

În tratamentul local al plăgilor infectate și aseptice, arsurilor de gradul I și II, exeme, dermatite, spray-ul este aplicat pe locul afectat prin pulverizare de la o distanță de 10 - 20 cm, de 1-2 ori pe zi, timp de 5 - 10 zile.

În tratamentul membranelor mucoase ale cavității bucale și faringelui, capătul liber al dispensorului se introduce în cavitatea bucală și se presează în ambele părți ale cavității bucale și faringelui (stânga și dreapta) de 2 - 3 ori pe zi, timp de 5 - 10 zile. Înainte de pulverizare se recomandă spălarea membranelor mucoase cu apă caldă. După aplicarea spray-ului animalele nu se vor hrăni 30 min.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne și organe: bovine, ovine, caprine – 0 zile.

Lapte: bovine, ovine, caprine – 0 zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra în loc uscat, la temperatura 0 - 25°C, ferit de lumină.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe ambalaj.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul nu se deversează în bazinele acvatice, fiind toxic pentru pești.

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente, trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale pentru utilizarea la animale:

Medicamentul de uz veterinar este numai pentru uz extern.

La speciile de animale cu hipersensibilitate, efectele adverse se pot manifesta cu incidență mai mare.



Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la medicament sau la una din componentele sale trebuie să evite contactul cu medicamentul de uz veterinar. Purtați echipament de protecție, inclusiv mănuși impermeabile atunci când se aplică medicamentul sau la manipularea animalelor tratate recent.

Dacă accidental stropii ajung pe piele, spălați cu apă și săpun. Spălați-vă mâinile și pielea expusă după manipulare cu medicamentul și înainte de mese. În caz de contact accidental cu ochii, clătiți cu apă curată potabilă și adresați-vă la medic.

În caz de ingerare accidentală, spălați imediat gura cu multă apă curată potabilă și adresați-vă la medic.

În caz de reacții adverse, consultați medicul și prezentați acestuia eticheta medicamentului.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Poate fi utilizat în perioada de gestație și lactație.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se cunosc.

Supradozare:

Utilizarea unei cantități mari de medicament poate duce la absorbția iod povidonei în sistem și influențarea glandei tiroide.

Incompatibilități:

În absența studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate în ambalaj original – 18 luni.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar – 60 zile.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane 50 ml tip spray, ambalate în cutie de carton, însoțite de prospectul de utilizare.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

04/2022

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

