Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Kubatol Pix, spray
45,2 mg/g

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament de uz veterinar deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

AVEFLOR, a.s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Republica Cehă, ID: 64259838, www.aveflor.cz

Telefon +420 493 551 111
Fax +420 493 551 112
e-mail jakost@aveflor.cz

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Kubatol Pix, spray

Substanța activă:
Pix fagi 45,2 mg/g

Excipienți:
Eter dimetilic, Etanol denaturat, Copolimer acrilic, Acetat de etil

Spray cutanat, soluție

3. INDICAŢII TERAPEUTICE

Dezinfectarea abraziunilor superficiale sau a zonelor afectate de dermatomicoză, dezinfectarea rănilor cauzate de canibalismul animalelor, tratamentul cosmetic al copitelor şi ca ajutor în chirurgia copitelor.

REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIŞINĂU, SOCIETATEA PE ACŢIUNI PENTRU DOCUMENTE «FARMAVET» S.A. IDNO 1002600025151

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

4. CONTRAINDICAŢII

Nu se utilizează pe răni care sângerează abundent sau pe zone puternic umflate.
Nu se aplică pisicilor.

5. REACŢII ADVERSE

Sunt necunoscute.

6. SPECII ŢINTĂ

Toate tipurile de animale neproductive, cu excepţia pisicilor.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ŞI DOZA PRESCRISĂ

Administrare cutanată.
Medicamentul se aplică prin apăsarea pulverizatorului pe suprafaţa de tratat de la o distanţă de 15-20 cm, astfel încât să nu se scurgă inutil. Pentru a mări efectul, se recomandă crearea a 2-3 straturi, întotdeauna după ce medicamentul s-a uscat complet. Dacă este necesar, aplicarea poate fi repetată după 2-3 zile.

8. PERIOADA DE AŞTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la temperaturi de până la 25 °C.
Recipientul este sub presiune: nu expuneţi la lumina soarelui sau la temperaturi de peste 50 °C.
A se păstra departe de sursele de aprindere - Fumatul interzis.
Nu utilizaţi acest medicament de uz veterinar după data de expirare menţionată pe partea de jos a ambalajului.

10. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament veterinar neutilizat sau deşeu derivat dintr-un astfel de medicament trebuie eliminat în conformitate cu legislaţia locală.

11. ATENŢIONĂRI SPECIALE

Precauţii speciale pentru persoanele care administrează un medicament de uz veterinar la animale:
Evitaţi contactul cu pielea, ochii şi membranele mucoase.
La manipularea medicamentelor de uz veterinar trebuie purtate mănuşi de protecţie.
Evitaţi inhalarea de aerosoli. Utilizaţi spray-ul numai în zone deschise sau bine ventilate.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la Pix fagi trebuie să administreze medicamentul veterinar cu prudență.
În caz de contact cu pielea sau cu mucoasele, clătiți imediat după expunere partea expusă cu multă apă. În caz de contact cu ochii, spălați ochii cu multă apă proaspătă. Solicitați asistență medicală în caz de iritație persistentă sau reacție alergică.
Nu mâncați, nu beți și nu fumați atunci când manipulați produsul.
După utilizare, spălați-vă bine pe mâini cu apă și săpun.
Medicamentul nu trebuie să intre în contact direct cu alimente, apă potabilă, jucării pentru copii.
Medicamentul este extrem de inflamabil. Nu pulverizați în flăcări deschise sau pe obiecte fierbinți. Nu găuriți recipientul gol și nu-l aruncați în foc.

Sarcina și alăptarea:
Siguranța medicamentului de uz veterinar pentru utilizare în timpul sarcinii și alăptării nu a fost stabilită.

Interacțiunea cu alte medicamente și alte forme de interacțiune:
Sunt necunoscute.

Supradozare
Nu reprezintă un risc atunci când se respectă instrucțiunile de utilizare.

Incompatibilitate:
Sunt necunoscute.

12. PERIOADA DE VALABILITATE
36 luni.

13. STATUT LEGAL
Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR
Flacon sub presiune din aluminiu cu supapă de aerosoli din oțel cromat cu folie PET și tub PE, atomizor (PP) și capac (PP).
Dimensiunea ambalajului:
150 ml (126 g)

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI
04/2022

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

REPUBLICA MOLDOVA, mun.CHIŞINĂU, SOCIETATEA PE ACŢIUNI PENTRU DOCUMENTE «FARMAVET» S.A. IDNO 1002600023161