

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Kubatol Pix, spray
45,2 mg/g

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Substanța activă:

Pix fagi 45,2 mg/g

Excipienți:

Pentru o listă completă a excipienților, a se vedea secțiunea 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Spray cutanat, soluție.

Lichid de culoare galbenă până la maro, cu un miros caracteristic, sub formă de aerosol cu un gaz propulsor.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii-țintă:

Toate speciile de animale nedestinate obținerii de produse și subproduse pentru consumul uman, cu excepția pisicilor.

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă

Dezinfectarea abraziunilor superficiale sau a zonelor afectate de dermatomicoză, dezinfectarea rănilor cauzate de canibalismul animalelor, tratamentul cosmetic al copitelor și ca ajutor în chirurgia copitelor.

4.3 Contraindicații:

Nu se utilizează pe răni care sângerează abundent sau pe zone puternic umflate.

Nu se aplică pisicilor.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu sunt.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Nu se aplică.

4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Evitați contactul cu pielea, ochii și membranele mucoase.

La manipularea medicamentelor de uz veterinar trebuie purtate mănuși de protecție.

Evitați inhalarea de aerosoli. Utilizați spray-ul numai în zone deschise sau bine ventilate.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la Pix fagi trebuie să administreze medicamentul veterinar cu prudență.



În caz de contact cu pielea sau cu mucoasele, clătiți imediat după expunere partea expusă cu multă apă. În caz de contact cu ochii, spălați ochii cu multă apă proaspătă. Solicitați asistență medicală în caz de iritație persistentă sau reacție alergică.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați atunci când manipulați medicamentul.

După utilizare, spălați-vă bine pe mâini cu apă și săpun.

Medicamentul nu trebuie să intre în contact direct cu alimente, apă potabilă, jucării pentru copii.

Medicamentul este extrem de inflamabil. Nu pulverizați în flăcări deschise sau pe obiecte fierbinți. Nu găuriți recipientul gol și nu-l aruncați în foc.

4.6 Reacții adverse:

Sunt necunoscute.

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Siguranța medicamentului de uz veterinar pentru utilizare în timpul sarcinii și alăptării nu a fost stabilită.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Sunt necunoscute.

4.9 Doză și calea de administrare

4.9.1 Doze:

Medicamentul se aplică prin apăsarea pulverizatorului pe suprafața de tratat de la o distanță de 15-20 cm, astfel încât să nu se scurgă inutil. Pentru a mări efectul, se recomandă crearea a 2-3 straturi, întotdeauna după ce medicamentul s-a uscat complet. Dacă este necesar, aplicarea poate fi repetată după 2-3 zile.

4.9.2 Mod de administrare:

Administrare cutanată.

Agitați înainte de utilizare. Recipientul trebuie să fie ținut în poziție verticală.

4.10 Supradozare

Nu reprezintă un risc atunci când se respectă instrucțiunile de utilizare.

4.11 Perioada de așteptare:

Nu este cazul.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice:

5.1.1 Grupa farmacoterapeutică: dermatologice, gudron.

Codul ATC: QD05AA

5.1.2 Mecanism de acțiune

Substanțele auxiliare conținute în spray creează o peliculă elastică densă pe zona afectată, care o protejează de umiditate și influențe externe, dar nu împiedică transpirația pielii.

5.1.3 Efecte farmacodinamice

Efectele de uscare și dezinfectare ale gudronului de fag, împreună cu microclimatul creat, favorizează viteza de regenerare a zonei tratate.

5.1.4 Eficacitate și siguranță clinică

Substanța activă, gudronul de fag, dezinfectează local, are proprietăți antiinflamatorii, bacteriologice, antimicotice.

5.2 Proprietăți farmacocinetice

Atunci când este aplicat pe zona afectată, practic nu pătrunde în epidermă și nu pătrunde în organe și țesuturi.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:

Eter dimetilic
Etanol denaturat
Copolimer acrilic
Acetat de etil

6.2 Incompatibilități:

Sunt necunoscute.

6.3 Perioada de valabilitate:

36 luni

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

A se păstra la temperaturi de până la 25 °C.

Recipientul este sub presiune: nu expuneți la lumina soarelui sau la temperaturi de peste 50 °C.

A se păstra departe de sursele de aprindere - Fumatul interzis.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Flacon sub presiune din aluminiu cu supapă de aerosoli din oțel cromat cu folie PET și tub PE, atomizor (PP) și capac (PP).

Dimensiunea ambalajului:

150 ml (126 g)

6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar

neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Orice medicament veterinar neutilizat sau deșeu derivat dintr-un astfel de medicament trebuie eliminat în conformitate cu legislația locală.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

AVEFLOR, a.s., Budčevs 26, 507 32 Kopidlno, Republica Cehă, ID: 64259838,

www.aveflor.cz

Telefon +420 493 551 111

Fax +420 493 551 112

e-mail jakost@aveflor.cz

