Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Inspector picături auriculare

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament de uz veterinar deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
- Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

SA Firma ştiinţifico-productivă "Ecoprom", Federaţia Rusă, Regiunea Moscova, raionul Liuberţî, or. Tomilino, str. Garşin nr.11.

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAŢIA ŞI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Inspector picături auriculare

1 ml conţine:
Substanţe active:
Levofloxacină hemihidrat - 3,33 mg
Moxidectină - 0,11 mg

Lista excipienţilor:
Acid salicilic, dimetil sulfoxid, tween-80 şi polietilenglicol (PEG 400).

Soluţie pentru administrare auriculară.

3. INDICAŢII TERAPEUTICE

Inspector picături auriculare este indicat câinilor, pisicilor pentru tratamentul otitelor acute şi cronice a urechii externe de etiologie bacteriană şi parazitară.

4. CONTRAINDICAŢII

Inspector picăturile auriculare sunt contraindicate la animalele cu sensibilitate individuală la componentele sale constitutive. Este interzisă utilizarea medicamentului la animalele cu perforarea membranei timpanice.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

5. REACȚII ADVERSE

Efectele secundare şi complicațiile la utilizarea medicamentului în conformitate cu această instrucțiune nu sunt. În caz de sensibilitate individuală crescută a animalului la componentele medicamentului şi apariția reacțiilor alergice, utilizarea sa este întreruptă şi, dacă este necesar, animalului i se prescrie terapie desensibilizantă.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini şi pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ŞI DOZA PRESCRISĂ

Inspector picături auriculare în stadiul inițial al otodectozei sunt utilizate de două ori cu un interval de 5-7 zile, în cazul complicațiilor otitei cu otită de etiologie bacteriană, inflamarea suprafeței interioare a auriculului şi apariția unor eliminări purulente-seroase o dată pe zi timp de 5-7 zile.

Înainte de utilizare se efectuează prelucrarea igienică a regiunii urechii, se îndepărtează crustele din canalul auditiv extern şi apoi se picură 2-5 picături de medicament în fiecare ureche (pentru pisici şi câinilor de rase mici a câte 2-3 picături, câinilor de rase medii a câte 4 picături, câinilor de rase mari - 5 picături). Auricula este pliată în jumătate pe lungime şi baza sa este masată cu scop de a preveni stropirea medicamentului (în cazul când animalul scutură din cap), capul animalului trebuie fixat timp de câteva minute. Medicamentul trebuie picurat în ambele urechi, chiar dacă semnele clinice ale bolii sunt detectate doar la o ureche. Când efectuați tratamentul, evitați stropirea picăturilor pentru urechi Inspector în ochii animalului.

La sfârşitul cursului de tratament, dacă microflora patogenă se regăseşte în raclaj (frotiuri) din canalul auditiv extern, tratamentul animalului se continuă timp de 5-7 zile (până la recuperarea clinică confirmată prin teste de laborator) folosind picături antibacteriene pentru urechi.

8. PERIOADA DE AŞTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

În loc uscat şi umiditatea relativă a aerului să nu depăşească 60%, ferit de lumină, inaccesibil copiilor, separat de alimente şi furaje, plasat la temperaturi de la +0 până la +25 °C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

«FARMAVET» S.A.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:
Nu sunt destinate utilizării la animalele productive.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:
Particularitățile acțiunii la prima administrare a medicamentului sau în caz de anulare acestuia, nu s-au stabilit.
Încălcările regimului de dozare a medicamentului trebuie evitate, deoarece aceasta poate duce la o scădere a eficacității terapeutice. Dacă se omite următoarea doză, cursul administrării medicamentului trebuie reluat cât mai curând posibil în regimul de dozare prevăzut în instrucțiune.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
Când manipulați cu medicamentul, trebuie să respectați regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță prevăzute atunci când lucrați cu medicamente.
Persoanele cu hipersensibilitate la componentele medicamentului trebuie să evite contactul direct cu medicamentul. La sfârșitul lucrului, mâinile trebuie spălate cu apă caldă și săpun.
În cazul contactului accidental al medicamentului Inspector picături pentru urechi cu pielea sau membranele mucoase ale ochilor, acestea trebuie clătite cu multă apă.
În cazul reacțiilor alergice sau a ingerării accidentale a medicamentului în corpul uman, trebuie să contactați imediat o instituție medicală (trebui să aveți instrucțiuni de utilizare a medicamentului sau o etichetă cu dvs.).

Utilizare în perioada de gestație și alăptare:
Nu este recomandată utilizarea în perioada de gestație și alăptare.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:
Nu utilizați Inspector picături auriculare, concomitent cu alte preparate insectoacaricide și antibacteriene pentru administrare auriculară.

Supradozare:
Simptomele supradozajului nu au fost identificate.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

24 luni.
Perioada de valabilitate a medicamentului, după prima deschidere este de 1 lună, cu condiția ca flaconul cu capac bine închis să fie depozitată în frigider.
A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fară prescripției veterinare.

REPUBLICA MOLDOVA, MUN. CHIȘINĂU, SOCIETATEA PE ACȚIUNI PENTRU DOCUMENTE «FARMAVET» S.A. IDNO 1002600008

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

14. NATURA ŞI COMPOZIŢIA AMBALAJULUI PRIMAR

Inspector picături auriculare sunt ambalate a câte 10 ml în flacon din sticlă brună, flaconul are capac prevăzut cu filet pentru controlul primei deschideri şi o pipetă încorporată în capac. Flacoanele sunt plasate în cutii individuale de carton împreună cu instrucţiunile de utilizare a medicamentului.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

04.2022

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIŞINĂU, SOCIETATEA PE ACŢIUNI
PENTRU DOCUMENTE
«FARMAVET»
S.A.
IDNO 1002600023121