



PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Vetbicin-3
600 000 UA
Pulbere sterilă

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră. - Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.

- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.

- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

- Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

OAȘ "Sintez", Federația Rusă
640008, or.Kurgan, bulevardul Constituției, 7.

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Vetbicin-3, 600 000 UA, pulbere sterilă

Vetbicin-3 în calitate de substanță activă conține un amestec din trei antibiotice:

Pentru dozajul de 600 000 UA: benzatin benzilpenicilină – 200 000 UA, benzilpenicilină sare de sodiu – 200 000 UA, benzilpenicilina procaina – 200 000 UA.

Medicamentul de uz veterinar prezintă o pulbere de culoare albă sau alb gălbuie, formînd cu apa suspensie stabilă.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Vetbicin-3 este recomandat pentru animale, inclusiv păsările de curte, pentru tratamentul pasteurelozei, bronhopneumoniei, bolilor aparatului uro-genital, antrax, necrobacteriozei, streptococozei, actinomicozei, carbuncului enfizimatos, precum și alte infecții primare și secundare, cauzate de agenți patogeni sensibili la penicilină.

4. CONTRAINDICAȚII

La o sensibilitate individuală crescută a animalului la antibioticele șirului penicilinei și procainei, utilizarea medicamentului de uz veterinar este contraindicată.

Medicamentul de uz veterinar nu se administrează în perioada de gestație sau în perioada de ouat.



5. REACȚII ADVERSE

Efectele secundare după administrarea medicamentului de uz veterinar în conformitate cu instrucțiunea, de regulă nu sunt înregistrate.

La apariția reacției alergice utilizarea medicamentului de uz veterinar se sistează și se injectează subcutanat adrenomimetice, intramuscular sau intravenos; soluție de clorură de calciu 10%.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, cabaline, caprine, ovine, porcine, iepuri.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Înainte de utilizare, în flaconul cu Vetbicin-3, perforând capacul și dopul de cauciuc, se adaugă 5-6 ml soluție pentru injecții (clorură de sodium 0,9%, soluție izotonică sterilă sau soluție de procaină de 1-2 %), flaconul se agită bine până când se formează o suspensie omogenă, care imediat se injectează la animal profund intramuscular. În caz că acul a nimerit într-un vas sangvin și a apărut o picătură de sânge, acul trebuie să fie extras și se repetă injecția în alt loc.

Suspensia obținută se administrează animalelor prin injecție unică intramusculară în următoarele doze:

Vite mari cornute	10 000 – 15 000 UA /kg animal masă vie
Cai	10 000 – 15 000 UA /kg animal masă vie
Vite mici cornute	15 000 – 20 000 UA /kg animal masă vie
Porci	10 000 – 20 000 UA /kg animal masă vie
Iepuri	10 000 – 15 000 UA / animal

Medicamentul de uz veterinar se administrează o singură dată.

Dacă este necesar, Vetbicin-3 se aplică repetat peste 3-4 zile.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Sacrificarea animalelor pentru carne este permisă nu mai devreme de 14 zile de la ultima aplicare Vetbicin-3. Carnea de la animalele sacrificate forțat, înainte de expirarea acestei perioade, poate fi utilizată pentru hrana animalelor carnivore.

Laptele de la animale, obținut în timpul tratamentului și timp de 10 zile după ultima injecție cu Vetbicin-3, se interzice de utilizat în scopuri alimentare. Laptele de acest tip poate fi utilizat, după tratament termic, pentru hrana animalelor.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Vetbicin-3 se păstrează în ambalajul producătorului, separat de produsele alimentare și furaje, în loc uscat, ferit de razele soarelui, la temperatura de 0-25 °C.

Vetbicin-3 se recomandă de păstrat în locuri inaccesibile pentru copii.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul de uz veterinar neutilizat se rebutează conform cerințelor sanitar-veterinare.

Flacoanele goale de Vetbicin-3 se interzic de utilizat în scopuri casnice, ele se supun rebutării împreună cu deșeurile casnice.





11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu Vetbicin-3 pentru injecție, este necesar de respectat regulile generale de igienă personală și a tehnicii securității, prevăzute pentru lucrul cu preparate medicamentoase. În cazul contactului spontan a medicamentului de uz veterinar cu pielea sau mucoasa oculară, se spală rapid cu o cantitate mare de apă. La oamenii cu sensibilitate mărită la componentele medicamentului de uz veterinar este recomandat să se evite contactul direct cu Vetbicin-3.

În cazul apariției reacției alergice sau la o pătrundere întâmplătoare a medicamentului de uz veterinar în organismul uman este necesar urgent de adresat la medic (este necesar de prezentat instrucțiunea de utilizare a medicamentului de uz veterinar și eticheta).

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Datele despre interacțiunea medicamentului de uz veterinar cu alte medicamente de uz veterinar nu sunt.

Supradozare:

Simptomele supradozării la animale nu s-au înregistrat.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate, în cazul respectării condițiilor de păstrare 3 ani de la data fabricației. Se interzice utilizarea Vetbicin-3 după expirarea termenului de valabilitate.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Se livrează medicamentul de uz veterinar în formă de pulbere sterilă ambalată a câte 600 000 UA în flacoane din sticlă neutră sigilată, cu o capacitate de 10 ml, cu dopuri de cauciuc și capace de aluminiu.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

06.2022

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

