

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Vetbicin-3

600 000 UI

Pulbere sterilă

2. COMPOZITIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Vetbicin-3 în calitate de substanță activă conține un amestec din trei antibiotice:

Pentru dozajul de 600 000 UI: benzatin benzilpenicilină – 200 000 UI, benzilpenicilină sare de sodiu – 200 000 UI, benzilpenicilina procaina – 200 000 UI.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere sterilă.

Pulbere pentru pregătirea suspensiei injectabile. Remediul prezintă o pulbere de culoare albă sau alb gălbuie, formînd cu apa suspensie stabilă.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii-țintă:

Bovine

Cabaline

Caprine

Ovine

Porcine

Iepuri

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă

Vetbicin-3 este recomandat pentru animale, inclusiv păsările de curte, pentru tratamentul pasteurelozei, bronhopneumoniei, bolilor aparatului uro-genital, antrax, necrobacteriozei, streptococozei, actinomicozei, carbuncului enfizimatos, precum și alte infecții primare și secundare, cauzate de agenți patogeni sensibili la penicilină.

4.3 Contraindicații:

La o sensibilitate individuală crescută a animalului la antibioticele șirului penicilinei și procainei, utilizarea medicamentului de uz veterinar este contraindicată.

Nu se administrează în perioada de gestație sau în perioada de ouat.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Efecte secundare după administrarea medicamentului de uz veterinar conform indicațiilor prospectului, de regulă, nu sunt înregistrate.

La apariția reacției alergice utilizarea medicamentului de uz veterinar se sistează și se injectează subcutanat adrenomimetice, intramuscular sau intravenos; soluție de clorură de calciu 10%.



4.5 Precauții speciale pentru utilizare

4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Ațiune specifică a medicamentului de uz veterinar în cazul administrării lui primare nu s-a înregistrat.

4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu Vetbicin-3, este necesar de respectat regulile generale de igienă personală și a tehnicii securității, prevăzute pentru lucrul cu medicamente de uz veterinar.

În cazul contactului spontan a preparatului cu pielea sau mucoasa oculară, se spală rapid cu o cantitate mare de apă. La oamenii cu sensibilitate mărită la componentele medicamentului de uz veterinar este recomandat să se evite contactul direct cu Vetbicin-3. În cazul apariției reacției alergice sau la o pătrundere întâmplătoare a medicamentului de uz veterinar în organismul uman, este necesar de adresat de urgență la medic (este necesar de prezentat prospectul și eticheta).

4.6 Reacții adverse:

Efectele secundare după administrarea medicamentului de uz veterinar conform indicațiilor prospectului, de regulă nu sunt înregistrate.

La apariția reacției alergice utilizarea medicamentului de uz veterinar se sistează și se injectează subcutanat adrenomimetice, intramuscular sau intravenos; soluție de clorură de calciu 10%.

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Medicamentul de uz veterinar nu se administrează în perioada de gestație sau în perioada de ouat.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiuni:

Datele despre interacțiunea medicamentului de uz veterinar cu alte medicamente de uz veterinar nu sunt.

4.9 Doză și calea de administrare:

Înainte de utilizare, în flaconul cu Vetbicin-3, perforând capacul și dopul de cauciuc, se adaugă 5-6 ml soluție pentru injecții (clorură de sodium 0,9%, soluție izotonică sterilă sau soluție de procaină de 1-2 %), flaconul se agită bine pînă cînd se formează o suspensie omogenă, care imediat se injectează la animal profund intramuscular. În caz că acul a nimerit într-un vas sangvin și a apărut o picătură de sînge, acul trebuie să fie extras și se repetă injecția în alt loc.

Suspensia obținută se administrează animalelor prin injectare unică intramusculară în următoarele doze:

Vite mari cornute	10 000 – 15 000 UI /kg animal masă vie
Cai	10 000 – 15 000 UI /kg animal masă vie
Vite mici cornute	15 000 – 20 000 UI /kg animal masă vie
Porci	10 000 – 20 000 UI /kg animal masă vie
Iepuri	10 000 – 15 000 UI / animal



Medicamentul de uz veterinar se administrează o singură dată.

Dacă este necesar, Vetbicin-3 se aplică repetat peste 3-4 zile.

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi, dacă este cazul):

Simptomele supradozării la animale nu s-au înregistrat.

4.11 Perioada de așteptare:

Sacrificarea animalelor pentru carne este permisă nu mai devreme de 14 zile de la ultima aplicare Vetbicin-3. Carnea de la animalele sacrificate forțat, înainte de expirarea acestei perioade, poate fi utilizată pentru hrana animalelor carnivore.

Laptele de la animale, obținut în timpul tratamentului și timp de 10 zile după ultima injecție cu Vetbicin-3, se interzice de utilizat în scopuri alimentare. Laptele de acest tip poate fi utilizat, după tratament termic, pentru hrana animalelor.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE:

5.1 Proprietăți farmacodinamice:

Grupa farmacoterapeutică: Antibiotice.

Cod veterinar ATC: QJ01CE30

Vetbicin-3 reprezintă un remediu anti-infecțios complex, care conține trei peniciline biosintetice, posedă un spectru larg de acțiune antibacteriană împotriva majorității microorganismelor gram-pozitive, inclusiv streptococilor, stafilococilor, pneumococilor, diplococilor, spirochetelor, bacilului de antrax, corynobacterium; nu are efect asupra bacteriilor anaerobe, micobacterii, ciupercilor, virusilor și ricketțiilor.

Mecanismul de acțiune bactericidă a penicilinelor este bazat pe inhibarea enzimelor transpeptidazei și carboxipeptidazei, ceea ce duce la o dereglare a legăturilor dintre moleculele peptidoglicanului și la distrugerea celulelor bacteriene.

5.2 Proprietăți farmacocinetice

După injectare intramusculară, Vetbicin-3 se absoarbe în sânge, lent se hidrolizează cu eliberarea benzilpenicilinei, atingând o concentrație maximă după 12-24 ore și se menține într-o concentrație terapeutică timp de 3-4 zile. Este excretat din organism, în principiu, prin urină și parțial cu materiile fecale.

Vetbicin-3 după gradul de toxicitate asupra organismului conform GOST 12.1.007. aparține clasei a 2-a de pericol (substanță foarte toxică).

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților: -

6.2 Incompatibilități:

Datele despre interacțiunea medicamentului de uz veterinar cu alte medicamente de uz veterinar nu sunt.



6.3 Perioada de valabilitate

Perioada de valabilitate, în cazul respectării condițiilor de păstrare 3 ani de la data fabricației.
Se interzice utilizarea Vetbicin-3 după expirarea termenului de valabilitate.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

Vetbicin-3 se păstrează în ambalajul producătorului, separat de produsele alimentare și furaje, în loc uscat, ferit de razele soarelui, la temperatura de 0-25 °C.
Vetbicin-3 se recomandă de păstrat în locuri inaccesibile pentru copii.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Se livrează medicamentul de uz veterinar în formă de pulbere sterilă ambalată a câte 600 000 UI în flacoane din sticlă neutră sigilată, cu o capacitate de 10 ml, cu dopuri de cauciuc și capace de aluminiu.

6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Medicamentul de uz veterinar neutilizat se rebutează conform cerințelor sanitar-veterinare.
Flacoanele goale de Vetbicin-3 se interzice de utilizat în scopuri casnice, ele se supun rebutării împreună cu deșeurile casnice.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

OAQ "Sintez", Federația Rusă
640008, or.Kurgan, bulevardul Constituției, 7.

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

220037

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

17.06.2022

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

06.2022

