Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Vetbicin-5
1 500 000 UI
Pulbere sterilă

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

PAO "Sintez", Fedrația Rusă
640008, or. Kurgan, bulevardul Constituției, 7.

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Vetbicin-5, 1 500 000 UI, pulbere sterilă

Vetbicin-5 în calitate de substanță activă conține un amestec din două antibiotice: benzatin benzilpenicilină – 1 200 000 UI, benzilpenicilina procaină – 300 000 UI.

Medicamentul de uz veterinar prezintă o pulbere de culoare albă sau alb gălbuie, formînd cu apa suspensie stabilă.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Vetbicin-5 este recomandat pentru animale pentru tratamentul infecțiilor de etiologie bacteriană, cauzate de agenți patogeni sensibili la benzilpenicilină.

4. CONTRAINDICAȚII

La o sensibilitate individuală crescută a animalului la antibioticele șirului penicilinei, utilizarea medicamentului de uz veterinar este contraindicată.
Nu se administrează în perioada de gestație.

5. REACȚII ADVERSE

Efectele secundare după administrarea medicamentului de uz veterinar în conformitate cu indicațiile prospectului, de regulă, nu sunt înregistrate.
La o sensibilitate individuală crescută a animalului la antibioticele șirului penicilinei și apariția reacțiilor alergice, utilizarea medicamentului de uz veterinar se sistează și se efectuează terapia de desensibilizare, se injectează adrenomimetice subcutanat, intramuscular sau intravenos; soluție de clorură de calciu 10% intravenos.

S.R.L. «VIOVANT» IDNO 1003601001778 FIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun.Chișinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, cabaline, caprine, ovine, porcine, iepuri

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Înainte de utilizare, în flaconul cu Vetbicin-5, perforînd capacul și dopul de cauciuc, se adaugă 5-6 ml soluție pentru injecții (sau soluție sterilă de clorură de sodiu 0.9%, sau soluție de novocaină sterilă de 1-2%), flaconul se agită bine pînă cînd se formează o suspensie omogenă, care imediat se injectează la animal intramuscular profund. În caz că acul a nimerit într-un vas sangvin și a apărut o picătură de sînge, acul trebuie să fie extras și se repetă injecția în alt loc.

Suspensia obținută se administrează animalelor prin injectare unică intramusculară în următoarele doze:

Vite mari cornute	10 000 – 15 000 UI /kg animal masă vie
Cai	10 000 – 20 000 UI /kg animal masă vie
Vite mici cornute	15 000 – 20 000 UI /kg animal masă vie
Porci	15 000 – 20 000 UI /kg animal masă vie
Iepuri	40 000 – 50 000 UI / animal

Dacă este necesar, Vetbicin-5 se aplică repetat peste 7-10 zile.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Sacrificarea animalelor pentru carne este permisă nu mai devreme de 21 zile de la ultima aplicare Vetbicin-5. Carnea de la animalele sacrificate forțat, înainte de expirarea acestei perioade, poate fi utilizată pentru hrana animalelor de blană.

Laptele de la animale, obținut în timpul tratamentului și timp de 14 zile după ultima injecție cu Vetbicin-5, se interzice de utilizat în scopuri alimentare. Laptele de acest tip poate fi utilizat, după tratament termic, pentru hrana animalelor.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Vetbicin-5 se păstrează în ambalajul producătorului, separat de produsele alimentare și furaje, în loc uscat, ferit de razele soarelui, la temperatura de 5-25 °C.
Vetbicin-5 se recomandă de păstrat în locuri inaccesibile pentru copii.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul de uz veterinar neutilizat se rebutează conform cerințelor sanitar-veterinare.
Se interzice de utilizat flacoanele goale de Vetbicin-5 în scopuri casnice, ele se supun rebutării împreună cu deșeurile casnice.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
În timpul lucrului cu Vetbicin-5, este necesar de respectat regulile generale de igienă personală și a tehnicii securității, prevăzute pentru lucrul cu medicamente de uz veterinar.
În cazul contactului spontan a medicamentului de uz veterinar cu pielea sau mucoasa oculară, se spală rapid cu o cantitate mare de apă. La oamenii cu sensibilitate mărită la componentele medicamentului de uz veterinar este recomandat să se evite contactul direct cu Vetbicin-5.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

În cazul apariției reacției alergice sau la o pătrundere întîmplătoare a medicamentului de uz veterinar în organismul uman, este necesar de adresat de urgență la medic (este necesar de prezentat prospectul și eticheta).

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:
Datele despre interacțiunea medicamentului de uz veterinar cu alte medicamente de uz veterinar nu sunt.

Supradozare:
Simptomele supradozării la animale nu s-au înregistrat.

12. PERIOADA DE VALABILITATE
Perioada de valabilitate, în cazul respectării condițiilor de păstrare - 3 ani de la data fabricației.
După data de expirare Vetbicin-5 nu trebuie să fie utilizat.

13. STATUT LEGAL
Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR
Se livrează medicamentul de uz veterinar în formă de pulbere sterilă ambalată ermetic în flacoane din sticlă neutră sigilată, cu o capacitate de 10 ml sau 20 ml, cu dopuri de cauciuc și capace de aluminiu.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI
06.2022

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

REPUBLICA MOLDOVA, or. IALOVENI
S.R.L.
«VIOVANT»
IDNO.1003601001778
FIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ