

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR**Binacar Forte**

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

AO"Agrobioprom", 105064, Federația Rusă, or. Moscova, str. Kazakova 6/1

AO"Agrobioprom", 143985, reg. Moscova, Balașiha, șos. Poltevscoe 4

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Binacar Forte, soluție de uz extern.

Soluție uleioasă, transparentă, de culoare de la galben-pal până la galben- maro.

1 ml de soluție conține:

Substanța activă:

Imidacloprid – 80 mg,

Fipronil - 15 mg.

Excipienți:


Alcool benzilic, butilhidroxitoluol (antioxidant BHT), acid citric.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Binacar Forte se indică câinilor și pisicilor în tratamentul și profilaxia acarozelor provocate de căpușele ixode, entomozelor provocate de purici, păduchi malofagi și hematofagi; dermatitei alergice apărute în urma înțepăturilor de insecte și căpușe și în prevenirea reinfestărilor cu ectoparaziți.

4. CONTRAINDICAȚII

Sensibilitate individuală sporită a animalului la componentele medicamentului (inclusiv în anamneză). Se interzice administrarea medicamentului animalelor bolnave de boli infecțioase și în perioada de convalescență, cățeilor cu vârsta sub 8 săptămâni și greutatea sub 1 kg, motănașilor sub 8 săptămâni și greutatea sub 0,5 kg, precum și animalelor altor specii, femelelor gestante și în lactație.



5. REACȚII ADVERSE

La administrarea conform instrucțiunii, reacții adverse și complicații nu apar.

În caz de hipersensibilitate individuală și apariția reacției alergice (roșeață, prurit), medicamentul se spală de pe suprafața pielii cu apă și săpun, pielea și blana se spală din abundență cu apă și la necesitate se indică antihistaminice și terapie simptomatică.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Binacar Forte se folosește o singură dată prin aplicarea pe pielea uscată, nedeteriorată a animalului, în locuri inaccesibile pentru lingere. Animalele sunt tratate la aer liber sau într-o încăpere bine ventilată.

Înainte de administrare vârful pipetei cu Binacar Forte se taie, se înlătură cu mâna blana și conținutul se aplică pe piele în 3-4 puncte (la baza craniului și între omoplați).

Doza aplicată este în dependență de greutatea și specia animalului.

Greutatea animalului	Număr de pipete
Pentru căței și câini de talie mică (pipetă cu 0,5 ml)	
2-5 kg	1
5-10 kg	2
10-20* kg	4
*La câinii cu greutatea > 20 kg se folosește medicamentul în raport de 1 ml la fiecare 10 kg ulterioare de greutate corporală.	
Pentru căței și câini de talie medie (pipetă cu 1,0 ml)	
2-5 kg	½
5-10 kg	1
10-20 kg	2
20-30 kg	3
30-40* kg	4
*La câinii cu greutatea > 40 kg se folosește medicamentul în raport de 1 ml la fiecare 10 kg ulterioare de greutate corporală.	
Pentru căței și câini de talie mare (pipetă cu 2,0 ml)	
10-20 kg	1
20-30 kg	1+1/2
30-40* kg	2
*La câinii cu greutatea > 40 kg se folosește medicamentul în raport de 1 ml la fiecare 10 kg ulterioare de greutate corporală.	
Pentru motănași și pisici (pipetă cu 0,4 ml)	
1-2 kg	½
3-4 kg	1
4-8 kg	2



Doza terapeutică minimă este de - 0,1 ml/kg greutate corporală.

Pentru nimicirea căpușilor, puricilor, păduchilor hematofagi și malofagi, tratamentul animalului se efectuează o singură dată, pentru a preveni reinfestarea sau a proteja de infestare - o dată în lună, pe tot parcursul sezonului de activitate a insectelor.

În caz de tratament și profilaxie a dermatitei alergice, legate de înțepăturile insectelor și căpușelor, se recomandă ca medicamentul să fie utilizat în combinație cu terapia patogenetică și simptomatică.

Medicamentul rămâne eficient după umectarea blănii, cu toate acestea, animalul nu trebuie lăsat să stea în apă mult timp după tratament. Dacă acest lucru nu poate fi evitat, se efectuează un tratament suplimentar al animalului cu medicament sub supravegherea medicului veterinar.

Tratamente suplimentare se permit să fie efectuate nu mai des de 1 dată în săptămână.

Dacă apare necesitatea de a spăla animalul cu șampon, se recomandă de a efectua acest lucru înainte de tratamentul cu Binacar Forte.

În scopuri preventive de reinfestare cu insecte, așternutul se schimbă sau se prelucrează cu soluție insecticidă conform instrucțiunii.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și nutrețuri, la T°C de la 0 până la +25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul nefolosit se utilizează în conformitate cu legislația în vigoare.

Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu se administrează animalelor productive.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

A se evita contactul Binacar Forte cu tunicile mucoase.

A nu se scălda animalul timp de 24 ore după aplicare și a nu se admite contactul cu copii mici.

Pentru a nu permite lingerea medicamentului, animalului i se îmbracă botniță sau guler de protecție care se scoate peste 15-20 minute după prelucrare.

A nu se aplica medicamentul pe pielea umedă sau lezionată.

Particularități deosebite în acțiunea medicamentului la prima lui administrare sau la anularea lui nu au fost înregistrate.



A se evita abaterile de la schema de bază a administrărilor pentru a nu diminua eficiența medicamentului. În caz de omitere a unui tratament planificat, administrarea se reia în aceeași doză conform aceeași scheme.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu Binacar Forte e important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

În timpul lucrului se interzice fumatul, consumul de alimente și băuturi.

Aplicarea medicamentului se va efectua în mănuși de cauciuc.

La finisarea lucrului mâinile se spală cu apă și săpun.

Timp de 24 ore, animalul nu se mângâie și nu se permite contactul cu copii mici.

Persoanelor cu hipersensibilitate la componentele medicamentului se recomandă evitarea contactului direct cu Binacar Forte.

În caz de contact accidental cu pielea sau tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundență cu apă. În caz de apariție a reacțiilor alergice sau în caz de ingerare accidentală, contactați o unitate medicală (cu sine de avut eticheta sau prospectul).

Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu se indică femelelor în perioada de gestație și lactație.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

A nu se folosi concomitent cu alte medicamente insecto-acaricide pentru animale.

Supradozare

Supradozarea poate provoca reacții adverse (deprimare, hipersalivație, tremor, vomă), în astfel de cazuri, medicamentul se spală de pe suprafață cu apă și săpun se recurge la terapie simptomatică.

12. PERIODA DE VALABILITATE

3 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Pipete din polimer a câte 0,4, 0,5, 1,0 și 2,0 ml plasate în cutii din carton.

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI

07.2022

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL "Zoofarmagro", m. Chișinău, str. Camenița 4a

Tel/fax +373 022 855-071; Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

