



PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

SEXINON

picături

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Întreprinderea Particulară „O.L.KAR-AgroZooVet-Service”

str. Eroilor Maidanului, 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina

tel. / fax: (0432) 55-14-28, (0432) 55-14-27

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

SEXINON

Picături orale.

1 ml de medicament conține:

Substanța activă:

Acetat de megestrol - 5 mg;

Lista excipienților:

Polietilen glycol - 400 până la 1 ml.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE (pe specii țintă)

Pentru blocarea (întreruperea) și amânarea estrului, prevenirea gestației nedorite la femele; pentru calmarea câinilor și pisoilor în călduri, care prezintă modificări de comportament (satiriazis) și pentru a suprima dorința sexuală la pisoii și câinii.



4. CONTRAINDICAȚII

Nu utilizați medicamentul în cazul bolilor ale sistemului genito-urinar, tumori, animale imature, gestante și care alăptează.

Nu se recomandă utilizarea medicamentului dacă au trecut mai mult de 3 zile de la debutul estrului și animalelor tinere ce se află în primul estru, din cauza dificultății de a determina începutul ciclului.

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

5. REACȚII ADVERSE

La pisici, megestrol acetat poate provoca suprimarea puternică a cortexului suprarenal, atrofia lor și este, de asemenea, posibil să se dezvolte diabet zaharat temporar, este posibil să se schimbe comportamentul animalului, să crească greutatea corporală, endometrita.

La câini, este posibilă creșterea apetitului, creșterea în greutate, modificări ale comportamentului, endometrita și mărirea dimensiunii glandei mamare.

În cazul utilizării prelungite a medicamentului, este posibilă o schimbare a caracterului, dezvoltarea glandelor mamare, o creștere a apetitului și ca urmare o creștere a greutății corporale a animalului.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini și pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Oral cu hrana sau forțat la baza limbii.

Pisici:

- pentru a preveni estrul - 1 ml de medicament, timp de 10-14 zile. După întreruperea administrării medicamentului, estru apare timp de 14 zile;
- pentru întreruperea estrului – a câte 1 ml de medicament zilnic, timp de 3-5 zile (din momentul în care apare semne de excitare sexuală);
- ca contraceptiv - 3 ml de medicament timp de 24 ore de la împerechere.

Cățele:

- pentru a preveni estrul - 1 ml de medicament la 10 kg de greutate corporală la fiecare 14 zile. După întreruperea administrării medicamentului, estrul apare timp de 21 zile;
- pentru întreruperea estrului – a câte 1 ml de medicament la 10 kg greutate corporală timp de 7 zile (din momentul debutului de excitare sexuală);
- ca contraceptiv – a câte 2 ml de medicament per 5 kg greutate corporală pe zi, timp de 2 zile după împerechere.



Pisoi:

- pentru calmare în timpul excitației sexuale – a câte 1 ml de medicament pe zi, timp de 3-5 zile.

Câini:

- pentru calmare în timpul excitației sexuale – a câte 1 ml de medicament per 10 kg de greutate corporali pe zi, timp de 5 zile.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

În loc uscat, ferit de lumină, inaccessibil copiilor, la temperaturi de la +5 °C până la +25 °C.

A nu se păstra împreună cu alimentele, băuturi sau hrana animalelor.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat, care are termen expirat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente, trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Când manipulați medicamentul, este necesar să respectați regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță prevăzute atunci când lucrați cu medicamente de uz veterinar.

Utilizare în perioada de gestație și alăptare:

A nu se utiliza la cățelele și pisicile gestante și lactante.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Administrarea concomitentă cu corticosteroizi (pe o perioadă lungă de timp) poate crește supresia suprarenalei și diabetul zaharat.

Supradozare:

Nu este stabilit.

Incompatibilități:

Rifampicina poate reduce acțiunea progestinelor (megestrol acetat) atunci când aceste medicamente sunt administrate concomitent.





12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

A câte 1, 2, 4 ml în fiole din polimer și / sau flacoane (din sticlă sau polimer cu dop de picurare), ambalate în cutii de carton.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

07.2022

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

