

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

SEXINON picături

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 ml de medicament conține:

Substanța activă:

Megestrolul acetat - 5 mg;

Excipienți:

Polietilen glycol - 400 până la 1 ml

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Picături orale

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii-țintă:

Câini și pisici.

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă:

Pentru blocarea (întreruperea) și amânarea estrului, prevenirea gestației nedorite la femele; pentru calmarea câinilor și pisoiilor în călduri, care prezintă modificări de comportament (satiriazis) și pentru a suprima dorința sexuală la pisoi și câini..

4.3 Contraindicații:

Nu utilizați medicamentul în cazul bolilor ale sistemului genito-urinar, tumori, animale imature, gestante și care alăptează.

Nu se recomandă utilizarea medicamentului dacă au trecut mai mult de 3 zile de la debutul estrului și animalelor tinere ce se află în primul estru, din cauza dificultății de a determina începutul ciclului.

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu sunt.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Nu sunt.



4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Când manipulați medicamentul, este necesar să respectați regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță prevăzute atunci când lucrați cu medicamente de uz veterinar.

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate):

La pisici, megestrol acetat poate provoca suprimarea puternică a cortexului suprarenal, atrofia lor și este, de asemenea, posibil să se dezvolte diabet zaharat temporar, este posibil să se schimbe comportamentul animalului, să crească greutatea corporală, endometrita.

La câini, este posibilă creșterea apetitului, creșterea în greutate, modificări ale comportamentului, endometrita și mărirea dimensiunii glandei mamare.

În cazul utilizării prelungite a medicamentului, este posibilă o schimbare a caracterului, dezvoltarea glandelor mamare, o creștere a apetitului și ca urmare o creștere a greutatei corporale a animalului.

4.7 Utilizare în perioada de gestație și alăptare:

A nu se utiliza la cățelele și pisicile gestante și lactante.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Administrarea concomitentă cu corticosteroizi (pe o perioadă lungă de timp) poate crește supresia suprarenalei și diabetul zaharat.

4.9 Doză și calea de administrare:

Oral cu hrana sau forțat la baza limbii.

Pisici:

- pentru a preveni estrul - 1 ml de medicament, timp de 10-14 zile. După întreruperea administrării medicamentului, estru apare timp de 14 zile;

- pentru întreruperea estrului – a câte 1 ml de medicament zilnic, timp de 3-5 zile (din momentul în care apare semne de excitare sexuală);

- ca contraceptiv - 3 ml de medicament timp de 24 ore de la împerechere.

Cățele:

- pentru a preveni estrul - 1 ml de medicament la 10 kg de greutate corporală la fiecare 14 zile. După întreruperea administrării medicamentului, estrul apare timp de 21 zile;

- pentru întreruperea estrului – a câte 1 ml de medicament la 10 kg greutate corporală timp de 7 zile (din momentul debutului de excitare sexuală);

- ca contraceptiv – a câte 2 ml de medicament per 5 kg greutate corporală pe zi, timp de 2 zile după împerechere.

Pisoi:

- pentru calmare în timpul excitării sexuale – a câte 1 ml de medicament pe zi, timp de 3-5 zile.





Câini:

- pentru calmare în timpul excitației sexuale – a câte 1 ml de medicament per 10 kg de greutate corporali pe zi, timp de 5 zile.

4.10 Supradozare:

Nu este stabilit.

4.11 Perioada de așteptare:

Nu este cazul.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice:

5.1.1 Grupa farmacoterapeutică: Contraceptivi hormonalți pentru uz sistemic, progestogeni.

Cod veterinar ATC: QG03AC05

Megestrolul acetat este un progestogen sintetic care afectează sistemul hipotalamo-hipofizar al animalului și blochează eliberarea hormonilor gonadotropi (foliculostimulanți și luteinizanți). În cazul deficitului a acestor hormoni în sânge, maturarea foliculilor din ovarele femelelor este întârziată, iar la masculi este blocată sinteza testosteronului, ca urmare se încetează estrusul și libidoul la animale. La câini și pisoi, megestrolul reduce activitatea sexuală și comportamentul asociat cu aceasta.

Mecanismul de acțiune al acetatului de megestrol are două efecte principale asupra organismului: efectul antigonadotrop se manifestă prin inhibarea secreției de hormoni gonadotropi și ovulația întârziată, care este clinic o consecință a estrusului întârziat; efectul progestogen se manifestă printr-un efect direct asupra endometrului uterului, care activează faza secretorie, încetinește implantarea embrionului, sporind proprietățile contraceptive ale medicamentului.

5.2 Proprietăți farmacocinetice

Megestrolul acetat este absorbit foarte bine de la nivelul tubului digestiv. Se leagă de proteinele plasmatice și în acest fel sunt transportate la nivel vascular. Se metabolizează în ficat și se elimină prin urină sub formă de sulfați și glucuronizi, timp de 1-2 zile.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:

Polietilen glycol - 400 până la 1 ml

6.2 Incompatibilități:

Rifampicina poate reduce acțiunea progestinelor (megestrol acetat) atunci când aceste medicamente sunt administrate concomitent.



