

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Unguent Hlorțin

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 g de medicament conține:

Substanța activă:

Clorhexidină bigluconat - 10,0 mg;

Oxid de zinc - 50,0 mg.

Excipienți:

Dimetilsulfoxid, PEG-1500, apă purificată.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Unguent

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii-țintă:

Bovine, cabaline, porcine, câini și pisici.

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă

Extern în complexul de măsuri terapeutice pentru tratamentul animalelor în caz de afecțiuni ale pielii cauzate de microflora bacteriană și fungică, și anume: tricofitia la vaci, câini, pisici, răni purulente la cabaline, abcese superficiale la bovine, cabaline, porcine, câini și pisici.

4.3 Contraindicații:

A nu se utiliza pentru dermatite, alergii, hipersensibilitate individuală la bigluconatul de clorhexidină.

Nu utilizați simultan cu medicamente de iod.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu sunt.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:

A se evita aplicarea unguentului pe mucoase.



4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanțe active sau excipienți trebuie să evite contactul cu medicamentul de uz veterinar.

În timpul aplicării unguentului se vor purta mănuși de protecție.

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate):

Nu sunt.

4.7 Utilizare în perioada de gestație și lactație:

Nu este cazul.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Este strict interzisă administrarea concomitentă a medicamentelor cu conținut de iod, pentru a evita apariția dermatitelor.

4.9 Doză și calea de administrare

Pentru uz extern.

Unguentul se aplică în strat subțire pe zona afectată a pielii de 1-2 ori pe zi până la recuperarea completă și 2-3 zile după dispariția semnelor clinice ale bolii. În cazul bolilor fungice, durata tratamentului este de 7-10 zile, după dispariția semnelor clinice ale bolii. În cazul rănilor purulente și abceselor, șervețelele de tifon se îmbibă cu unguent și se aplică în rană. Pansamentele se efectuează zilnic până când țesuturile purulente-necrotice sunt complet eliminate.

4.10 Supradozare

Nu s-a observat.

4.11 Perioada de așteptare:

Nu este cazul.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice:

5.1.1 Grupa farmacoterapeutică:

ATC vet QD08AC52 Clorhexidină, în combinații.



5.1.2 Mecanism de acțiune

Unguentul posedă acțiune antiinflamatoare, analgezic local, amplifică procesele de exudare, purifică plăgile purulente. Unguentul are un efect fungicid și bactericid pronunțat datorită proprietăților sinergice ale componentelor. Baza de unguent promovează pătrunderea componentelor active ale medicamentului în piele, unde distrug agenții patogeni existenți pe toată grosimea leziunii.

5.1.3 Efecte farmacodinamice

Medicamentul are un efect antiseptic pronunțat. Componentele unguentului sunt eficiente împotriva gram-pozitive (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Mycobacterium spp.*, *Corynebacterium xerosis*, *Micrococcus spp.*, *Sarcina lutea*, *Clostridium spp.*, *Bacillus subtilis*) și bacteriile gram-negative (*Escherichia coli*, *Shigella spp.*, *Salmonella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Neisseria spp.*, *Enterobacter spp.*, *Serratia marcescens*, *Providencia spp.*), precum și ciuperci de drojdie (*Candida spp.*), dermatofiți (*Dermatophytes*, *Microsporum*, *Trichophyton*, *Trichoderma*), virusuri lipofile, hlamidia. Medicamentul are un efect antiinflamator, astringent și anestezic local.

5.1.4 Eficacitate și siguranță clinică

Unguent Hlorițin pentru uz extern, prezintă o înaltă eficiență și siguranță de utilizare la animalele domestice. Produsul poate fi cu ușurință administrat în orice condiții. Aceste aspecte diminuează în sine costul măsurilor de tratament și profilaxie, precum și riscurile de apariție a reacțiilor adverse.

5.2 Proprietăți farmacocinetice

Absorbția sistemică este pronunțată, concentrația plasmatică maximă fiind sub limita de detecție, ceea ce reflectă faptul că aplicarea topică nu determină efecte sistemice evidente sau reacții adverse generale. Absorbția transcutanată poate fi crescută în cazul pielii lezate.

6.1 Lista excipienților:

Dimetilsulfoxid, PEG-1500, apă purificată.

6.2 Incompatibilități

Nu utilizați simultan cu medicamente de iod.

6.3 Perioada de valabilitate:

2 ani.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

În loc uscat, ferit de lumină, plasat la temperaturi de la 0 până la +25 °C.

A nu se păstra cu alimente, băuturi și hrana pentru animale.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.





6.5 Natura și compoziția ambalajului primar:

Recipiente 20 g și tuburi laminate 100 g.

6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului. Medicamentul nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă datorită pericolului pentru pești și alte organisme acvatice. Nu contaminați lacurile, cursurile de apă sau canalizarea cu medicamentul sau cu ambalajul acestuia.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

Întreprinderea Particulară „O.L. KAR-AgroZooVet-Service”

str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272 B, or. Șargorod, reg. Vinița, Ucraina, 23500

tel.: +38 (043) 442-12-54, fax: +38 (043) 442-17-87

e-mail: vet@olkar.com.ua, www.agroolkar.com.ua

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

220048

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

27.09.2022

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

09.2022

