

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

INSEKTOSTOP spray

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

SRL «NPP «SUZIRYA», str. Poltavskii șleah, 115, or. Harkov, 61093, Ucraina

SRL «NPP «SUZIRYA», str. Zernovaia, 4, or. Harkov, 61105, Ucraina

tel.: +38 (057) 766-36-36

office@priroda.ua

priroda.ua

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA.

INSEKTOSTOP spray

Soluție de uz extern, spray insecto-acaricid.

Soluție transparentă incoloră sau de culoare galben deschis până la galben, cu un miros slab specific.

100 ml de medicament conține:

Substanță activă:

Fipronil – 0,3 g

Lista excipienților:

Polietilenglicol - 400;

Alcool izopropilic;



3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Tratamentul și prevenirea infestațiilor cu ectoparaziți la câini și pisici: purici (*Ctenocephalides* spp.), păduchi (*Linognathus setosus*) în toate stadiile de dezvoltare, păduchi hematofagi (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*), căpușe (*Ixodes* spp., *Dermacentor* spp., *Rhipicephalus* spp., *Hyalomma* spp., *Haemaphysalis* spp.); acarieni acariformi (*Sarcoptes canis*, *Notoedres cati*, *Otodectes cynotis*, *Cheyletiella* spp.).

4. CONTRAINDICAȚII

A nu se administra animalelor bolnave, epuizate și slăbite!

A nu se administra la animale cu vârsta sub 10 săptămâni!

A nu se administra la animale cu sensibilitate la fipronil și alte componente ale medicamentului!

5. REACȚII ADVERSE

Administrarea medicamentului la animale cu sensibilitate individuală sporită la fipronil poate provoca iritații ale pielii.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZĂ PRESCRISĂ

Medicamentul se administrează extern.

Tratarea animalelor se efectuează numai în aer liber sau într-o zonă bine ventilată. Agitați bine flaconul înainte de utilizare, direcționați jetul de lichid spre corpul animalului la o distanță de 10-15 cm.

Medicamentul se aplică pe întreaga suprafață a corpului animalului, în sensul opus creșterii blănii, astfel încât să ajungă nu numai pe blană, ci și pe piele, reieșind din 3-6 ml per 1 kg greutate corporală, prin apăsarea clapetei pulverizatorului, 7 pulverizări (1 ml) pentru flacoanele de 100 și 250 ml. Se recomandă, de asemenea, și tratarea pernulelor de pe lăbuțe. Tratând zona din jurul ochilor și capul, aplicați medicamentul pe mână, folosindu-se de mănuși, și frecați pielea animalului, evitând contactul cu membranele mucoase.

În cazuri de otodectoză la animale, suprafața internă a pavilionului auricular și a canalului auditiv extern se curăță de cerumen, cruste și exudat, după care medicamentul se pulverizează în ambele urechi, chiar dacă doar una este afectată, câte 0,5 ml (3-4 pulverizări). Pentru distribuirea uniformă a medicamentului, pliați pavilionul urechii în jumătate și masați ușor. Tratamentul se efectuează de 2-3 ori la un interval de 7-10 zile.

În cazuri de sarcoptoză, notoedroză și heiletioză medicamentul se aplică pe zonele afectate ale pielii curățate în prealabil de cruste, cuprinzând până la 1 cm din pielea limitrofă neafectată, reieșind din 1 ml (7 pulverizări) per 10 cm² din zona afectată a pielii animalului. Tratamentul se efectuează de 2-4 ori la un interval de 7-10 zile până la recuperarea clinică a animalelor, confirmată de două rezultate negative unui examen acarologic.



Cu scop profilactic pentru a evita re-infestarea animalelor cu ectoparaziți, prelucrați periodic locurile de adăpost ale acestora (cuști pentru câini, boxe, etc.) și obiectele de îngrijire (așternuturi, păături, etc.) reieșind din calcul 2 ml (14 pulverizări) per 1m².

O singură aplicare previne infestarea cu căpușe pe o perioadă de 3 săptămâni și pe o perioadă de 4 săptămâni infestarea cu purici. În cazul tratării animalelor cu blană lungă doza medicamentului se mărește cu 20-25%. Nu se recomandă îmbăierea animalelor cu 3 zile înainte de tratament și 3 zile după.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc uscat și întunecat, separat de alimente și furaje, inaccesibil copiilor și animalelor, la o temperatură de 4°C - 25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul neutilizat sau cu termen expirat este eliminat în conformitate cu legislația în vigoare.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Nu sunt.

Precauții speciale pentru utilizare la animale

A nu se admite contactul cu ochii și membranele mucoase ale animalelor.

A nu se administra pe cale orală.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:


În atenția stăpânilor animalelor, respectați principalele reguli de igienă și măsurile de securitate când lucrați cu medicamente de uz veterinar.

Tratarea animalelor se efectuează numai în aer liber sau într-o zonă bine ventilată. Nu permiteți animalelor să lingă medicamentul.

După aplicarea medicamentului nu permiteți copiilor să se joace cu animalul tratat sau să-l mângâie până la uscarea completă a blănii.

În caz de contact accidental cu pielea sau mucoasele, imediat clătiți cu apă din abundență..

După ce ați manipulat medicamentul, spălați-vă bine pe mâini cu săpun.



Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Administrarea medicamentului animalelor gestante sau celor lactante trebuie să se bazeze pe o evaluare a riscului și a necesității tratamentului de către un medic veterinar.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune

A nu se administra concomitent cu alte medicamente insecto-acaricide.

Supradozare

Animalele tolerează bine fipronilul în doză terapeutică. Doza care depășește doza terapeutică de 5 ori, nu provoacă semne clinice de otrăvire. Antidot – sulfat de atropină.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

36 (XXXVI) luni

13. STATUT LEGAL

Să eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane din polimer cu pulverizator x 100 ml, 250 ml.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

09.2022

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

