

**REZUMATUL CARACTERISTICILOR
MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR**

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR
INSEKTOSTOP spray

2. COMPOZIȚIE CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

100 ml de soluție conține:

Substanță activă:

Fipronil – 0,3 g

Excipienți:

Polietilenglicol – 400, alcool izopropilic.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție de uz extern, spray insecto-acaricid.

Soluție transparentă incoloră sau de culoare galben deschis până la galben, cu un miros slab specific.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1. Specii țintă

Câini, pisici.

4.2 Indicații pentru utilizare cu specificarea speciilor țintă

Tratamentul și prevenirea infestațiilor cu ectoparaziți la câini și pisici: purici (*Ctenocephalides* spp.), păduchi (*Linognathus setosus*) în toate stadiile de dezvoltare, păduchi hematofagi (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*), căpușe (*Ixodes* spp., *Dermacentor* spp., *Rhipicephalus* spp., *Hyalomma* spp., *Haemaphysalis* spp.); acarienii acariformi (*Sarcoptes canis*, *Notoedres cati*, *Otodectes cynotis*, *Cheyletiella* spp.).

4.3 Contraindicații

A nu se administra animalelor bolnave, epuizate și slăbite!

A nu se administra la animale cu vârsta sub 10 săptămâni!

A nu se administra la animale cu sensibilitate la fipronil și alte componente ale medicamentului!

4.4. Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Nu sunt.





4.5. Precauții speciale pentru utilizare

4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale

A nu se admite contactul cu ochii și membranele mucoase ale animalelor.

A nu se administra pe cale orală.

4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În atenția stăpânilor animalelor, respectați principalele reguli de igienă și măsurile de securitate când lucrați cu medicamente de uz veterinar.

Tratarea animalelor se efectuează numai în aer liber sau într-o zonă bine ventilată. Nu permiteți animalelor să lingă medicamentul.

După aplicarea medicamentului nu permiteți copiilor să se joace cu animalul tratat sau să-l mângâie până la uscarea completă a blănii.

În caz de contact accidental cu pielea sau mucoasele, imediat clătiți cu apă din abundență.

După ce ați manipulat medicamentul, spălați-vă bine pe mâini cu săpun.

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)

Administrarea medicamentului la animale cu sensibilitate individuală sporită la fipronil poate provoca iritații ale pielii.

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Administrarea medicamentului animalelor gestante sau celor lactante trebuie să se bazeze pe o evaluare a riscului și a necesității tratamentului de către un medic veterinar.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune

A nu se administra concomitent cu alte medicamente insecto-acaricide.

4.9 Doză și calea de administrare

Medicamentul se administrează extern.

Tratarea animalelor se efectuează numai în aer liber sau într-o zonă bine ventilată. Agitați bine flaconul înainte de utilizare, direcționați jetul de lichid spre corpul animalului la o distanță de 10-15 cm.

Medicamentul se aplică pe întreaga suprafață a corpului animalului, în sensul opus creșterii blănii, astfel încât să ajungă nu numai pe blană, ci și pe piele, reieșind din 3-6 ml per 1 kg greutate corporală, prin apăsarea clapetei pulverizatorului, 7 pulverizări (1 ml) pentru flacoanele de 100 și 250 ml. Se recomandă, de asemenea, și tratarea pernulelor de pe lăbuțe. Tratând zona din jurul ochilor și capul, aplicați medicamentul pe mână, folosindu-se de mănuși, și frecați pielea animalului, evitând contactul cu membranele mucoase.



În cazuri de otodectoză la animale, suprafața internă a pavilionului auricular și a canalului auditiv extern se curăță de cerumen, cruste și exudat, după care medicamentul se pulverizează în ambele urechi, chiar dacă doar una este afectată, câte 0,5 ml (3-4 pulverizări). Pentru distribuirea uniformă a medicamentului, pliați pavilionul urechii în jumătate și masați ușor. Tratamentul se efectuează de 2-3 ori la un interval de 7-10 zile.

În cazuri de sarcoptoză, notoedroză și heiletioză medicamentul se aplică pe zonele afectate ale pielii curățate în prealabil de cruste, cuprinzând până la 1 cm din pielea limitrofă neafectată, reieșind din 1 ml (7 pulverizări) per 10 cm² din zona afectată a pielii animalului. Tratamentul se efectuează de 2-4 ori la un interval de 7-10 zile până la recuperarea clinică a animalelor, confirmată de două rezultate negative unui examen acarologic.

Cu scop profilactic pentru a evita re-infestarea animalelor cu ectoparaziți, prelucrați periodic locurile de adăpost ale acestora (cuști pentru câini, boxe, etc.) și obiectele de îngrijire (așternuturi, păături, etc.) reieșind din calcul 2 ml (14 pulverizări) per 1m².

O singură aplicare previne infestarea cu căpușe pe o perioadă de 3 săptămâni și pe o perioadă de 4 săptămâni infestarea cu purici. În cazul tratării animalelor cu blană lungă doza medicamentului se mărește cu 20-25%. Nu se recomandă îmbăierea animalelor cu 3 zile înainte de tratament și 3 zile după.

4.10 Supradozare

Animalele tolerează bine fipronilul în doză terapeutică. Doza care depășește doza terapeutică de 5 ori, nu provoacă semne clinice de otrăvire. Antidot – sulfat de atropină.

4.11 Perioada de așteptare

Nu este cazul.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1. Proprietăți farmacodinamice:

5.1.1 Grupa farmacologică

Codul ATC vet QP53, ectoparaziticide, insecticide și repelente (QP53AX15, fipronil).

5.1.2 Mecanism de acțiune

Fipronilul afectează sistemul nervos central al ectoparaziților, fără a afecta sistemul nervos central al mamiferelor. Mecanismul de acțiune al fipronilului la nevertebrate constă în faptul că medicamentul inhibă trecerea ionilor de clor în canalele de clorură dependente de GABA (acidul gamma amino butiric) ai ectoparaziților, tulburând activitatea sistemului nervos. Prin blocarea sistemică de către fipronil a sistemului nervos, parvine excitația nervoasă și moartea ectoparaziților.



Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

5.1.3 Efecte farmacodinamice

Fipronilul aparține familiei chimice fenilpirazol.

Fipronilul omoară puricii în 24 de ore, căpușele și păduchii în decurs de 48 de ore după aplicarea medicamentului.

5.1.4 Eficacitate și siguranță clinică

Fipronil se utilizează pentru prevenirea și distrugerea puricilor *Ctenocephalus* spp., păduchilor *Linognathus setosus*, căpușelor *Dermacentor* spp., *Rhipicephalus* spp., *Ixodes* spp., *Hyalomma* spp., *Haemaphysalis* spp.; Fipronilul este, de asemenea, eficient împotriva scabiei și a acarienilor. Eficacitatea fipronilului a fost dovedită și împotriva altor specii de acarieni *Sarcoptes canis*, *Notoedres cati*, *Otodectes cynotis*, precum și a unor specii *Cheyletiella* spp., care provoacă dermatită atopică. De asemenea, s-a dovedit că fipronilul este eficient împotriva păduchilor hematofagi *Trichodectes canis* și *Felicola subrostratus* la câini și pisici.

5.2 Proprietăți farmacocinetice (Absorbție, distribuție, metabolism, excreție)

Fipronilul acționează prin contact și practic nu se absoarbe în piele. Se acumulează în epidermă, foliculii piloși, glandele sebacee și posedă o acțiune de contact îndelungată. Se creează un efect de „rezervor” care asigură o activitate reziduală pe termen lung a fipronilului.

După aplicare topică, medicamentul se distribuie pe suprafața corpului timp de aproximativ 24 de ore.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților

Polietilenglicol-400, alcool izopropilic

6.2 Incompatibilități

A nu se administra concomitent cu alte medicamente insecto-acaricide.

6.3 Perioada de valabilitate

36 (XXXVI) luni.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

A se păstra la loc uscat și întunecat, separat de alimente și furaje, inaccesibil copiilor și animalelor, la o temperatură de 4°C - 25°C.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Flacoane din polimer cu pulverizator x 100 ml, 250 ml.



6.6 Măsuri speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Medicamentul neutilizat sau expirat este eliminat în conformitate cu legislația în vigoare.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

SRL «NPP «SUZIRYA», str. Poltavskii șleah, 115, or. Harkov, 61093, Ucraina

tel.: +38 (057) 766-36-36

office@priroda.ua

priroda.ua

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

220053

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE (sau data reînnoirii certificatului de înregistrare)

27.09.2022

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

09.2022

