Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

MOXISTOP pentru pisici

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament de uz veterinar deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

SRL «NPP «SUZIRYA», str. Poltavskii şleah, 115, or. Harkov, 61093, Ucraina
tel.: +38 (057) 766-36-36
office@priroda.ua
priroda.ua

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAŢIA ŞI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

MOXISTOP pentru pisici

1 ml de soluţie conţine:
Substanţele active:
Praziquantel – 40 mg;
Moxidectină – 10 mg.
Lista excipienţilor:
PEG - 400, alcool izopropilic, dimetilsulfoxid.

3. INDICAŢII TERAPEUTICE

Prevenirea şi tratamentul infestaţiilor cu nematode (Toxocara cati, Toxoscaris leonine, Ancelostoma tubaeforme, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, Angiostrongylum vasorum, Crenosoma vulpis, Thelazia callipaeda), cestodoze (Dipilidium caninum, Echinoccus granulosus, Echinococcus multilocularis, Taenia pisifoemis, Taenia hydatigena, Mesocestoides spp.) şi invazii mixte de nematode şi cestode la pisici.
Prevenirea dirofilariozei la pisici (Dirofilaria immitis, Dirofilaria repens microdirofilariae stadii L3 şi L4).

REPUBLICA MOLDOVA mun. CHIŞINĂU
PENTRU FACTURI
«VETECO ALLIANCE» S.R.L.
IDNO 1014600033771
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

4. CONTRAINDICAŢII

A nu se administra la pisici cu vârsta sub 7 săptămâni!
A nu se administra la animale cu sensibilitate crescută la componentele medicamentului!
A nu se administra la animale epuizate şi bolnave de boli infecţioase!

5. REACŢII ADVERSE

După aplicarea medicamentului la animale uneori pot apărea reacţii adverse ca: prurit tranzitoriu, eritem, semne de blană unsuroasă, care repede dispar.
În cazuri dacă animalul linge locul de aplicare după tratament, pot apărea hipersalivaţia şi voma, semne neurologice. Aceste semne dispar fără tratament.
În cazuri rare, acţiunea medicamentului poate provoca schimbări în comportament, apatie, agitaţie şi inapetenţă.

6. SPECII ŢINTĂ

Pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ŞI DOZA PRESCRISĂ

Pentru animale cu greutatea corporală diferită, utilizaţi pipetele de volum corespunzător:

Greutatea corporală a animalului, kg	Marcarea pipetei	Volumul pipetei, ml	Moxidectină, mg	Praziquantel, mg
de la 1 până la 4 kg	pentru pisici cu o greutate sub 4 kg	0,4	4	16
de la 4,1 până la 10 kg	pentru pisici cu o greutate de la 4 până la 10 kg	1,0	10	40

Mod de administrare

Soluţie de uz extern, se aplică direct pe piele într-un loc inaccesibil pentru lins (regiunea greabănului şi de-a lungul coloanei vertebrale).
Medicamentul se aplică pe piele uscată, intactă. Îndepărtaţi blana de pe ceafa pisicii, la baza craniului, astfel încât pielea să fie vizibilă. Rupeţi partea superioară a pipetei şi plasaţi vârful pipetei pe piele, golind conţinutul acestei direct pe piele. În cazul tratamentului animalelor de mari dimensiuni, conţinutul pipetei se aplică pe piele în 3-4 locuri de-a lungul coloanei vertebrale, de la greabăn până la coadă.
Pentru deparazitarea animalelor infestate cu nematode şi cestode gastrointestinale medicamentul se utilizează în scop terapeutic o singură dată, în scop profilactic – o dată pe lună.
Pentru prevenirea dirofilariozei în regiunile nefavorabile, medicamentul se utilizează în perioada primăvară – vară - toamnă: înainte de începerea zborului de ţânţari şi moschite (purtători de *Dirofilaria*

PENTRU FACTURI «VETECO ALLIANCE» S.R.L.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

immitis, *Dirofilaria repens*) o singură dată, apoi o dată pe lună şi ultima dată nu mai devreme de o lună după finalizarea zborului de insecte.
Medicamentul distruge dirofilariile mature, dar reduce numărul de microdirofilarii care circulă în sânge.

8. PERIOADA DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

9. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A se păstra în ambalajul închis al producătorului, la loc uscat inaccesibil copiilor şi animalelor, separat de alimente şi furaje, la o temperatură de 5°C - 25°C.

10. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR
Medicamentul neutilizat sau expirat este eliminat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

11. ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă
Administrarea medicamentului animalelor cu o greutate corporală sub 1 kg trebuie să se bazeze pe o evaluare a riscului şi a necesităţii tratamentului.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale
A nu admite contactul medicamentului cu ochii şi membranele mucoase ale animalelor.
Nu permiteţi animalelor tratate recent să se lingă reciproc.
A nu aplica medicamentul pe pielea umedă sau lezată.
Utilizarea frecventă a şamponului după tratarea animalelor reduce eficacitatea medicamentului.
A nu admite pătrunderea medicamentului în apă, prin urmare, după tratarea animalelor cu acest medicament, nu le permiteţi să se scalde în bazine acvatice deschise timp de 4 zile.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
Persoanele care manipulează medicamentul, trebuie să respecte regulile generale de igienă personală şi măsurile de siguranţă prevăzute atunci când se lucrează cu medicamentele de uz veterinar.
În cazul contactului accidental al medicamentului cu pielea sau membranele mucoase ale ochilor, acestea trebuie clătite cu multă apă.
Persoanele cu hipersensibilitate la componentele medicamentului trebuie să trateze animalul în mănuşi de cauciuc.

REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIŞINĂU
PENTRU FACTURI
«VETECO ALLIANCE» S.R.L.
IDNO 1014600033271
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun.Chișinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat
Medicamentul se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.
Deparazitarea femelelor gestante şi lactante, în caz de necesitate, se efectuează sub supravegherea unui medic veterinar cu cel puţin 3 săptămâni înainte de data preconizată pentru fătare şi 2-3 săptămâni după fătare.

Interacţiuni cu alte medicamente de uz veterinar şi alte forme de interacţiune
Nu utilizați medicamentul concomitent cu piperazină și alte medicamente care inhibă colinesteraza, precum şi cu antiparazitare pe bază de lactone macrociclice.

Supradozare
În caz de supradozare a medicamentului, la animal pot fi observate stare depresivă, refuz de hrană, salivare excesivă şi o tulburare a tractului gastro-intestinal, mers nesigur, tremur.
În aceste cazuri, se administrează enterosorbente şi medicamente de terapie simptomatică.

12. PERIOADA DE VALABILITATE
3 ani.
A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL
Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ŞI COMPOZIŢIA AMBALAJULUI PRIMAR
Pipete polimerice a câte:
0,4 ml pentru pisici cu o greutate corporală sub 4 kg;
1,0 ml pentru pisici cu o greutate corporală de 4-10 kg.
Pipete polimerice ambalate în cutie de carton a câte 1 buc.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI
09.2022

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIŞINĂU
PENTRU FACTURI
«VETECO ALLIANCE» S.R.L.
IDNO 1014600032027
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ