

**REZUMATUL CARACTERISTICILOR
MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR**

OXICRID PULV. 40%, 400 mg/g, pulbere solubilă pentru broiler și suine.

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 g medicament conține:

Substanța activă

Oxitetraciclina clorhidrat - 400 mg

Excipienți:

Dextroză.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE**4.1 Specii țintă:**

Broileri și suine

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă:

Medicamentul se recomandă la broileri și suine în prevenirea (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) și tratamentul următoarelor afecțiuni determinate de microorganisme sensibile la acțiunea oxitetraciclinei:

Broileri: holera aviară produsă de *Pasteurella multocida*, enterite colibacilare produse de *E. coli*.

Suine: enterite produse de *E. coli*, pneumonie produsă de *M. hyopneumoniae*.

4.3 Contraindicații:

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la excipient.

Nu se administrează la animalele cu disfuncții hepatice, renale sau hematopoeza.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu exista

4.5 Precauții speciale pentru utilizare**4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:**

Utilizarea medicamentului de uz veterinar trebuie să se bazeze pe rezultatele testelor de sensibilitate și să țină cont de politicile oficiale și locale referitoare la măsurile antimicrobiene. Utilizarea medicamentului în afara instrucțiunilor din RCM poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la oxitetraciclina și poate duce la scăderea eficacității tratamentelor cu antimicrobiene din clasa tetracinelor ca urmare a rezistenței încrucișate.



4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Medicamentul determină iritarea pielii, a tractului respirator și a ochilor în caz de inhalare sau contact.

Se vor lua măsuri de protecție corespunzătoare în timpul realizării amestecului medicamentului cu apa de băut.

Personalul care administrează medicamentul trebuie să poarte mănuși, ochelari de protecție și mască. În caz de contact cu ochii, aceștia se vor spăla cu apă și săpun.

Nu se va fuma, bea sau manca în timpul manipulării medicamentului.

În caz de ingerare accidentală a medicamentului sau alergii provocate de contactul acestuia cu pielea solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul medicamentului sau eticheta.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la unul dintre componentele medicamentului, trebuie să evite contactul cu acesta.

4.6 Reacții adverse:

Ca și în cazul celorlalte tetraciline, pot apărea tulburări intestinale și mai rar reacții alergice sau fotosensibilitate.

4.7 Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

A nu se utiliza la scroafele gestante sau în lactație.

Nu se utilizează la păsările care produc ouă pentru consum uman.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Medicamentul nu se va administra simultan cu antiacide pe baza de aluminiu, cu calciu, magneziu sau preparate pe bază de fier și săruri pe bază de bismut datorită chelării.

4.9 Doza și calea de administrare:

Tratamentul constă în administrarea medicamentului Oxicrid pulv. 40%, pe cale orală, în apa de băut, timp de 5-7 zile consecutive, în doze diferite, în funcție de specie, vârstă, greutate corporală, stare fiziologică și stare de sănătate.

La broileri: o doză de 40 mg s.a. / kg g.c. / zi, respectiv 100 mg medicament Oxicrid pulv. 40% / kg g.c. / zi.

La suine: o doză de 20 mg s.a. / kg g.c. / zi, respectiv 50 mg medicament Oxicrid pulv. 40% / kg g.c. / zi.

Se utilizează următoarea schemă de tratament:

$\text{mg medicament} / \text{kg g.c.} / \text{zi} \times \text{greutatea medie corporală a animalelor de tratat (kg)}$

$\text{Consumul mediu zilnic de apă (litri)/animal}$

$= \text{mg Oxicrid pulv. 40\%} / \text{litru de apă}$



Animalele trebuie să bea numai apă medicamentată.

Ingerarea apei medicamentate de către animale poate fi afectată din cauza bolii. În caz de ingerare insuficientă a apei medicamentate se va revizui schema de tratament.

Pentru a se asigura administrarea unei doze corecte, greutatea corporală a animalelor trebuie determinată cât mai precis posibil.

4.10 Supradozare:

A nu se depăși doza recomandată.

În caz de supradozare pot apărea tulburări digestive manifestate prin vomă, diaree, colici, lipsa apetitului. Se va stopa tratamentul cu Oxicrid Pulv. 40% și se va institui un tratament simptomatic.

4.11 Perioada de așteptare:

Carne și organe

Broileri: 7 zile.

Suine: 6 zile.

Nu este autorizată utilizarea la păsările care produc ouă pentru consum uman.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

Grupa farmacoterapeutică: antimicrobiene de uz sistemic, tetraciline

Codul veterinar ATC QJ01AA06

5.1 Proprietăți farmacodinamice:

Oxitetraciclina este un antibiotic cu spectru larg, din grupa tetracinelor, obținut din culturi de *Streptomyces rimosus*, care acționează prin inhibarea sintezei proteice. Pătrunderea acestor agenți în microorganismele susceptibile este mediata de proteine transportoare unice pentru membrana citoplasmatică internă bacteriană. Legarea substanței de subunitatea 30S a ribozomului bacterian blochează accesul aminoacil ARNt la complexul ARNm-ribozom la nivelul sistusului acceptor, inhibând astfel sinteza proteinelor bacteriene.

5.2 Proprietăți farmacocinetice:

Absorbție:

Oxitetraciclina este incomplet absorbită de la nivelul tractului gastrointestinal. Absorbția este scăzută în prezența calciului, magneziului, fierului datorită procesului de chelatizare.

Cantitatea de oxitetraciclina absorbită este invers proporțională cu cantitatea administrată. Este afectată de un pH alcalin.

Distribuție

Concentrația plasmatică maximă apare la scurt timp după administrare.

Volumul de distribuție al oxitetracilinei în corp este foarte mare, pentru că se leagă de proteinele plasmatic, fiind regăsită în toate organele.



Metabolism:

Toate tetraciclinele se concentrează în ficat, unde sunt parțial metabolizate și conjugate pentru a forma glucuronizi solubili.

Excreție:

Tetracicline sunt excretate în principal prin rinichi. O parte se excretă prin fecale. Oxitetraciclina este excretată în concentrații mari de către ficat și bilă.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:

Dextroza

6.2 Incompatibilități:

În absența studiilor de compatibilitate a medicamentului de uz veterinar nu trebuie amestecat cu alte medicamente de uz veterinar.

6.3 Perioada de valabilitate:

Perioada de valabilitate a medicamentului așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

Perioada de valabilitate după reconstituire în apa de băut: 24 ore.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

A nu se refrigera sau congela.

A se feri de îngheț.

A se păstra în ambalajul original.

A se păstra în loc uscat.

A se proteja de lumina directă.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar:

Pungi cu 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg și saci cu 10 kg, 25 kg și 50 kg din folie laminată Polietilenă tereftalat/ Polietilena de joasă densitate

Ambalaj secundar:

Cutie din carton care conține 4 pungi x 5 kg.

6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente, trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Animale tratate vor fi menținute în adăposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecțiile de la acestea se vor colecta și nu se vor utiliza la fertilizarea solului.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

S.C. CRIDA PHARM S.R.L.

Str. Intrarea Vagonetului, Nr. 2, Bl. 101, Ap. 47, Sector 6, București, România.

Tel/Fax. + 4021 430.43.99, E-mail: office@cridapharm.ro

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

220057

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

26.10.2022

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

10.2022

